N° 102.

—

PRIX-COURANT

POUR 1863

DES

PLANTES DISPONIBLES

CHEZ

L. JACOB-MAKOY ET CIE

HORTICULTEURS

PRÈS DE LA STATION DES GUILLEMINS ET DU VIADUC
DE Ste-VÉRONIQUE

A LIÉGE (BELGIQUE)

LIEGE
IMPRIMERIE DE J. DESOER, LIBRAIRE
—
1863

AVIS.

Les prix sont cotés en francs de Belgique ou de France. Les commandes doivent mentionner exactement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition. Les frais d'emballage et d'expédition sont à charge de l'acheteur, et les plantes voyagent aux risques et périls du destinataire. Les personnes avec lesquelles l'établissement n'est pas en relation sont priées d'accompagner leur commande du montant, ou d'indiquer le mode de paiment qu'elles désirent adopter; autrement on fera suivre contre remboursement. Les paiments doivent être faits en numéraire belge ou français, ou rixthalers de Prusse en papier, à raison de 3 fr. 70 c., ou bien en lettres de change payables, au choix, sur la Belgique, la Hollande, Paris, Lille, Aix-la-Chapelle, Cologne.

Die Preise sind in Francs effectifs angesetzt. Die Bestellungen müssen genau die Adresse der Bestimmung, so wie die Versendungsweise enthalten. Den Verpackungen und Versendungen wird alle mögliche Sorgfalt gewidmet, geschehen aber für Rechnung und Gefahr den Besteller. Abnehmer, womit das Etablissement nicht in Verbindung steht, sind gebeten ihren Bestellungen die Bezahlung hinzuzufügen; oder die Weise anzugeben wie sie dieselbe einzuschlagen wünschen, widrigenfalls wird den Betrag der Summe nachgenommen. Die Bezahlungen müssen in belgischem oder französischem Gelde, oder die preussischem Papiergelde, den Thaler zu 3 fr. 70 cent. gerechnet, oder in Wechsel auf Belgien, Holland, Paris, Lille, Aachen, Cöln zahlbar, geschehen.

(**Affranchissement réciproque**.)

N° 102.

PRIX-COURANT

POUR 1863

DE

L. JACOB-MAKOY ET CIE

HORTICULTEURS

A LIÉGE (BELGIQUE).

PLANTES NOUVELLES.

SERRE CHAUDE.

Aralia Ghiesbreghtii.

Magnifique ; égalant en élégance tout ce qui a paru de ce genre . . . . 20 »

Caladium Lowi (Alocasia).

Cette magnifique nouveauté est aussi belle et aussi ornementale que *Alocasia metallica* et *Caladium Veitchi*, et nous croyons qu'elle ne sera pas moins recherchée. . . . . 30 à 50 »

Caladium Cannartii (Amœnum).

Autre nouveauté non moins remarquable, sur un beau vert de fond, visible aux bords du limbe ; il est blanc-corrodé, le centre et le long des nervures principales sont carmin éclatant, tandis que de nombreuses macules irrégulières blanches, entourées de vert, viennent encore ajouter à cette feuille si ornementale. . . . . 10 »

Cissus Sp. Palembang.

Feuille très-veloutée et très-élégante, beau pendant des Cissus déjà connus. . . . . 3 »

Coleus Malabaricus. . . . 3 »

Coleus Scutellarioïdes rubra.

Très-belle espèce nouvelle, introduite directement chez nous du Java. Quoique moins riche quant aux couleurs que le *Coleus Verschaffelti*, nous ne doutons pas qu'il ne soit accueilli favorablement dans l'horticulture.

Une vigueur remarquable, des feuilles très-développées, d'un pourpre noirâtre se rapprochant de celles du *Perilla nankinensis*, le recommandent assez aux amateurs.

La pièce . . . . 2 »
La douzaine . . . . . . 15 »

Cypripedium Hookeri.

Magnifique. . . . . 80 »

Gesneria refulgens.

Fleurissant très-abondamment pendant l'hiver, feuilles amples velouté-cramoisi, fleur orange-écarlate à gorge jaune. 3 »

Gloxinia erecta nouveaux. *(Gains de l'établissement.)*

Emma Demet, fleur bien faite, blanc bordé de rose tendre; *très-belle*. . . . . 3 »
J. Pirlot, carmin très-vif bordé de blanc ; *extra*. . . . . . 3 »
Mme B. Sauvage, fleur très-grande bien érigée, blanc et rose ; *extra* . . . . 3 »
Mme Th. Godin, fleur très-grande jaunâtre, ponctué de violet sur l'extrémité de la fleur ; *magnifique* . . . . 3 »
Mlle Hippert, blanc teinté légèrement de lilas ; *très-jolie*. . 3 »
Mlle Juliette Dawans, fleur très-grande, bien faite, se tenant bien droite, d'un blanc rose bordé de rose carmin ; *plus que belle*. . . . . 5 »
Maria Closon, fleur bien faite, d'un blanc pur bordé de bleu ; *variété charmante*. . . . . 3 »

Hechtia Ghiesbreghti.

Feuilles nombreuses, longues et bien étalées, d'un beau vert luisant à la surface, mais devenant brun violacé au soleil, couvertes en dessous d'un duvet blanc, épis très-long composé de petites fleurs blanches . . . . 15 »

Heterocentron glandulosum

A grandes fleurs blanches, floraison très-abondante en hiver 5 »

Heterocentron subtriplinervium . 2 »

Mikania Verschaffelti.

Très-jolie plante grimpante, rivalisant, pour le coloris de ses feuilles et son élégance, avec le *Mikania speciosa*, si avantageusement connu . . . . 10 »

Monochætum sericeum floribundum.

Cette plante, d'une culture facile, fleurit abondamment en hiver, et donne de grandes et jolies fleurs rose-violet. . . . . 2 »

Monochætum Humboldtianum . 10 »

Pogonanthera reflexa.

Plante à feuillage coloré . . . . 4 »

FOUGÈRES.

Doryopteris grande.

Magnifique. . . . . 15 à 35 »

Pteris nemoralis, fol. variegata.

Feuillage des plus ornemental . . . . 15 »

SERRE FROIDE.

Aralia Standishii.

Magnifique . . . . 15 »

Aspidistra angustifolia, fol. var.

Plante charmante, très-bien panachée . . . . 5 »

Azalea indica Mme Wagner (*Versch.*)

Fleurs grandes bien semi-doubles d'un rose vif, cramoisi foncé au centre et légèrement maculé teinté de violet sur le reste, macules de cette dernière teinte en accents circonflexés vers le centre supérieur. Floraison abondante et facile, port très-élégant . . . . 7 »
Bel exemplaire . . . . 15 »

Azalea indica, William Bull (*Versch.*)

Fleurs très-grandes (*huit cent. de diamètre*) semi-doubles; pétales très-amples d'un beau rose vif, les trois supérieurs relevés de rose carmin violacé vif, avec de charmantes macules accents circonflexes très-rapprochées et d'une teinte plus foncée; variété de premier mérite . . . . 7 »
Bel exemplaire . . . . 15 »

Camellia Baron de Vrière (*Versch.*)

Fleurs plus que moyennes, d'un beau rose, blanchâtre au centre, les pétales extérieurs arrondis et faiblement échancrés, les intérieurs oblongs, tous imbriqués avec la plus grande régularité, et finement veinés et lignés de cramoisi. 15 »

Camellia Comte de Toll (*Versch.*)

Fleurs moyennes, rose tendre tout-à-fait virginal, transparent, pétales arrondis, égaux, bien étalés, lignés-veinés également de rose violacé, variété de premier ordre . . . 15 »

Camellia Vicomte de Nieuland (*Versch.*)

Aussi remarquable par son imbrication parfaite que par sa teinte rose si délicate et si fraîche. Fleurs au-dessus de la grandeur moyenne, pétales amples ovés-arrondis, réguliers, une échancrure assez profonde au sommet de chacun, tandis que vers le centre se montrent quelques stries d'un blanc indécis. . . . . 15 »

Camellia Souvenir d'Émile Defresne.

Remarquable par l'imbrication toute géométrique de ses pétales, d'un vermillon vif teinté de carmin avec de nombreuses et larges stries d'un beau blanc, divisées elles-mêmes par des strioles pourpres. C'est certainement un des Camellia les plus méritants. . . . . 15 »

Dracœna luteo-lineata.

Bel exemplaire . . . . 30 à 50 »

Lithospermum fruticosum . . . 1 50

Serissa fœtida, fol. lutea-marginata.

Feuilles nettement bordées d'une ligne jaune d'or éclatant et d'un charmant effet . . . . 2 »

Sisyrinchium versicolor . . . 10 »

Abutilon nouveaux.

Luteum album, blanc jaunâtre paille, belle forme. 1 50
Miniatum, beau rose veiné teinté saumon, magnifique . . . 1 50
Roseum superbum, beau rose violacé, coloris très-riche. . . 1 50
Sulphureum, fleur très-grande, jaune soufre légèrement rosé. 1 50

Fuchsia nouveaux.

Les variétés précédées d'un astérisque (*) sont à fleurs doubles.

* **Ch. Lambinet** (*Lem*), sépales rose carmin foncé, relevées, corolles lilas marron refleté bleu clair, *extra*.
* **Colossus** (*Smith*), corolle très-longue, prune, sépales cramoisi écarlate.

Edith (*Banks*), forme dans le genre de *Comet*, mais d'un coloris plus pâle.
Finsbury Volunter (*Banks*), sépales carmin feu, bien relevées, corolles extra-larges en parachute, bleu lavande, *extra*.
Her Majesty (*Bull*), sépales blanc de neige corolle lilas rose.
Lady of Killarney (*Roll*), corolle blanc de neige, tubes et sépales corail éclatant.

* **La Gloire** (*Lemoine*), nouveauté du plus grand mérite, vigoureux, fleur se rapprochant de *Fuchsia Ch. Lambinet* quant au coloris ; mais sous le rapport de la forme elle lui est bien supérieure, et comme grandeur, elle est le double, la couleur est bleu lavande en ouvrant, passant au lilas rose cendré au complet épanouissement, les sépales très-larges, recourbées en demi-cercle sont carmin vif ; variété extra et des plus florifères . . . . 4 »
* **Mme Froebel** (*Lemoine*), fleurs extra-grandes très-doubles, même compactes, belle forme, pétales riche bleu nuancé d'une teinte cuivrée, sépales couleur corail, larges, bien relevées, végétation moyenne, forme des fleurs très-régulière, très-florifère. 4 »

Le Florifère (*Lem*), sépales relevées rouge clair, corolle bleu violet.
Marginata (*Banks*), tube blanc paille, sépales blanches très-larges, corolle teintée rose et carmin, extra.

* **Mastodonde** (*Lem*), sépales écarlate vif, corolle pourpre foncé, fleur la plus grande connue.

Meteor (*Cartner*), remarquable par ses feuilles rouge vif et jaune.

* **Président Porcher** (*Lem*), fleurs énormes bleu indigo, sépales carmin vif, extra.

Queen of Summer (*Smith*), corolle laque, tube et sépales blanc perle.
Reine Blanche (*Banks*), sépales blanches, corolle nankin écarlate.

* **Rifleman** (*Smith*), sépales cramoisi riche, corolle violet pourpre.

Rubra grandiflora (*Versch*), très-beau.
Sensation (*Bull*), sépales cramoisi corolle très-large couleur pourpre.

* **Universal**, corolle violette, sépales cramoisi élégamment relevées, *extra*.

La pièce à 1 fr. (*sauf les deux variétés cotées 4 fr.*)
Douze variétés pour fr. 10 (*id.*)

Gazania aurantiaca (*Rend*).

Fleur aussi grande que le type, d'un beau jaune serin, avec une belle et large auréole noire, tachetée de blanc au centre . . 2 »

Gazania Souci (*Rend*).

Fleur grande, jaune d'or très-brillant . . . . 2 »

Pelargonium zonale nouveaux (Géranium).

Amelina Grisau (*Lem*), blanc rosé, centre rouge vif, extra. . 2 »
Amiral Protet (*Rend*), rouge feu, nuancé de vermillon, œil blanc, très-belle variété pour la pleine terre . . . . 2 »
Cécile Labbé (*Chardine*), rose saumoné vif bordé blanc . . . 5 »
Eugénie Mézard (*Bab*), ombelle de fleurs énorme et compacte, d'un joli saumon vif, pointé blanc au centre, extra. . . 2 »
Fanny Labrousse (*Jarlot*) . . . . 4 »
Henriette Renard (*Rend*), rose saumon marbré blanc, veiné pourpre . . . . 3 »
Jean Valjean (*Lem*), fleurs très-grandes, forme parfaite, rose aurore brillant, centre chair. . . . . 4 »
Léonie Nivelet (*Nivelet*), grosse ombelle compacte de forme parfaite, saumon nuancé de blanc et maculé plus clair (*extra*) . . . . 3 »
Les Misérables (*Lem*), variété de *Nosegay*, ombelles fortes, capucine brillant, multiflore et nain. . . . . 3 »
Le Saumon (*Nivelet*), fleurs des plus grandes, de forme parfaite, saumon nuancé de blanc et maculé plus clair sur les pétales supérieurs, grosse ombelle, très-florifère (*extra*). 3 »
Mad Lemoine (*L.*), rose saumoné . . . . 1 »
Marie Labbé (*Chardine*), blanc à large centre rose saumoné, ombelle compacte . . . . 5 »
Mérimac (*Lem*), variété de *Nosegay*, floraison des plus abondantes, fleurs larges, couleur fondue d'ocre jaune et de carmin, à grand effet, devra être placé au centre des massifs . . . . 3 »
M. Mangenet (*Jarlot*), ponceau clair, fl. très-larges . . . . 4 »
Prince impérial (*Jarlot*), nain, écarlate brillant, centre jaune. 4 »
Roi d'Italie (*Lem*), fleurs énormes et parfaites, rose de Chine recouvert de minium, centre blanc; extra . . . . . . 2 »
Triomphe de Meudon . . . . 4 »

Petunia nouveaux à fleurs doubles.

Docteur Demange (*Rend*), fleur de pivoine très-double, rouge strié blanc; *extra*. . . . . 2 »
Duc de Guise (*Rend*), fl. grande rose foncé, reticulée de pourpre et de cramoisi, très-multiflore . . . . 2 »
Gigantea plena (*Rend*), fleur la plus grande du genre, se tenant parfaitement bien, d'un beau rose tendre nuancé de blanc et de lilas, fleurissant abondamment . . . . 2 »
Mme Racouchot (*Rend*), fleurs énormes rose et violet maculé de grosses taches blanc pur; *très-joli* . . . . 2 »

Mme Sablières (*Rend*), fleur grande très-double, blanc de neige, maculé de violet vif au centre des pétales, plante excellente pour massifs . . . . 2 »
Marie Stuart (*Rend*), fleur énorme blanc clair, veiné légèrement de violet au centre . . . . 2 »
M. Hoste (*Rend*), fleur très-grande excessivement double, imbriqué, rose hortensia bordé de vert . . . . 2 »
M. Lequesne (*Rend*), fleur grande très-double, blanc lilacé veiné fortement de bleu tirant sur le violet . . . . . 2 »
Phebus (*R.*), fleur très-grande bien imbriquée amarante foncé; admirable . . . . 2 »
Président Desrobert (*R*), fleur grande, très-double, rouge foncé rubanné et strié blanc pur; très-beau . . . . . . 2 »
Virgina (*R.*), fleur moyenne amaranthe foncé, veiné pourpre. 2 »

Petunia nouveau *à fleur simple.*

Comtesse de Bimard (*Hoste*), grande fl. rouge à bords verts . 1 50

Verveines nouvelles. — *Variétés anglaises.*

Annihiliator.
Blue beauty.
Cherfiel.
Comtess of Aylesford.
— of Bradford.
Decorator.
John Eduard.
Liveliness.
Queen of Prussia.
Raphael.
Spark.
Thackeray.
The palace.
Unique.

La douzaine. . . 5 »
La pièce au choix . » 50

Clémence Isaure (*Lem*), violet foncé large centre jaune clair. 1 »
Cossette (*Gérard*), fleurs très-grandes, bouquet bien fourni, rose amaranthe clair, centre jaune . . . . 1 »
Gavroche (*Lem*), écarlate, large, centre jaune . . . . . . 1 »
W. Scheurer (*Lem*), beau bleu clair à centre blanc . . . . 1 »

Variétés italiennes à fleurs rubannées et striées.

Adwocato Savaldi, rose clair, poudré bigarré ponceau.
Angelina Fachi, violet foncé rubanné de cramoisi.
Angelo Menzii, fl. très-grandes, couleur de chair, bigarré lilas.
Arriva di Garibaldi a Brescia, fleurs très-grandes, blanc pur panaché amaranthe.
Comtessa Camilla Fé, rouge clair, panaché amaranthe.
Giardiniere Capra, fleurs très-grandes, beau blanc pur à grands rubans violets, la plus belle des panachées.
Palavicina da Brescia, grands bouquets, fl. grandes, rose passant au rose chair, centre rouge vif.

La pièce. » 50
La douzaine. 5 »

PLEINE TERRE.

PLANTES VIVACES.

Anemone japonica, Honorine Jobert.

Magnifique nouveauté à fleurs blanches, d'un effet charmant, floraison abondante, rusticité à toute épreuve . . . . . . 4 »

Aquilegia formosa, fol. eleg. var.

Plante charmante par son feuillage . . . . 2 »

Bambusa Fortuneï, fol. niveo-vitatis.

Plante magnifique et du plus bel effet. Sa stature naine, ses feuilles rubannées de blanc de neige, lui vaudront de nombreux amateurs. . . . . 10 »

Delphinium, Mme Guichard (*Rougier*).

Ses grandes fleurs bleues, simples, mais très-compactes, le rendent plus que recommandable . . . . 3 »

Gaillardia Loiseli.

Variété des plus rustiques gagnée par M. de Guasco, ses fleurs, beaucoup plus grandes que celles de *G. grandiflora*, ses couleurs très-vives, le recommandent suffisamment. . . . 3 »

Mimulus cupreus.

Introduction nouvelle du Chili, qui probablement supportera nos hivers à l'air libre; elle s'élève à la hauteur de 15 à 20 centimètres, ses fleurs abondantes, qui se succèdent jusqu'aux gelées, sont du plus riche orange écarlate cuivré, par sa petite stature elle sera d'une grande ressource pour bordures ou pour former des massifs nains, aussi bien que comme ornement dans les serres froides. . . . . 1 »

Pentstemon nouveaux.

Dame blanche (*Lem.*), fleurs grandes blanc pur . . . . . . 2 »
Evêque Myriel (*Lem.*), fleurs très-grandes, lilas rose à l'extérieur, intérieur blanc pur, bords lilas . . . . . . 2 »
F. Hock (*Lem.*), fleurs grandes, rose pur, gorge nette, blanc saumoné. . . . . 2 »
Thibaut et Keteler (*Lemoine*), violet puce, gorge blanc pur; plante à effet . . . . 2 »
Van Volxem (*Lem.*), fleurs grandes, rose vif, gorge blanc saumoné, beau. . . . . 2 »
Wiot (*Lem.*), fl. grandes, rose carmin vif, large gorge blanc pur, lobes roses (extra). . . . . 2 »

Potentilla vase d'or (*Lem.*)

Fleurs les plus grandes de toutes, et les plus doubles parmi les doubles, globuleuses, beau jaune de chrôme foncé; plante très-multiflore et restant naine. . . . . 5 »

Pyrethrum, Hermann Stenger (*Lem.*)

Fleurs énormes (9 cent. de diamètre) bombées, tubes très-longs, échancrés, transformés en pétales, fleurs sans le moindre vide, ressemblant à une reine Marguerite imbriquée des plus doubles; rose foncé, à centre de la fleur rose tendre. 6 »

Reineckea carnea, fol. albo-vitatis.

Aspect et port d'une Hemérocale, feuilles largement striées-rubannées de blanc sur vert foncé. Plante indispensable dans toute colletion de plantes panachées. . . . . 3 à 6 »

Salvia azurea, Devilleana.

Fleurs semblables par la forme à celles de *Salvia azurea*, se rapprochant de *Salvia patens* par la couleur, ses rameaux et ses grappes de fleurs sont plus ramifiés que dans le type. . 2 »

Sedum Sieboldi, foliis medio-picta.

Tout le monde connaît le *Sedum Sieboldi*, chaque amateur le possède en bordure, sur un rocher ou dans une suspension, ses rameaux flexibles, ses feuilles d'un vert glauque, souvent rosées, ses fleurs carminées, et sa rusticité à toute épreuve, le rendent recommandable sous tous les rapports.

Le Sedum foliis medio picta que nous offrons aujourd'hui est bien autrement remarquable, et c'est certainement une des plus belles et des plus charmantes introductions dont soit dotée l'horticulture. Ses fleurs sont semblables à celles du type; mais ses feuilles rondes, ornées au centre d'une large tache jaune soufre, et bordées d'une jolie teinte rose, produisent un effet charmant . . . . 8 »

ARBUSTES NOUVEAUX.

Aucuba Himalayca (*Sieb*).

Feuilles ovales-oblongues d'un beau vert foncé, ses fruits, orange brillant, produisent un bel effet . . . . 5 »

Aucuba japonica viridis fœmina (*Sieb*).

Feuilles d'un vert foncé et sans tache, fruits roses. . . . 6 »

Ceanothus Arnoldi.

Les Ceanothus sont on ne peut plus recommandables par leur abondante floraison; celui-ci l'emporte sur les autres en ce qu'il est rustique. Ses énormes thyrses de 20 cent. de longueur, du plus beau bleu ciel, lui vaudront de nombreux amateurs . . . . 4 »

Clematis erecta hybrida (*Deville*).

Hybride tenant de la *Cl. erecta* par la disposition de ses fleurs, de l'*integrifolia* par leur couleur, ses tiges s'élevant à 60-80 cent. sont surmontées d'une grappe terminale portant de 25 à 35 fleurs grandes pour l'espèce, elles sont violet foncé, à étamines jaunes . . . . 10 »

Deutzia gracilis, fol. var.

Tout le monde connaît le type, son port si gracieux, sa floraison si abondante, celui-ci est vivement panaché et d'autant plus digne de figurer dans tous les jardins . . . . 10 »

Evonymus jap., fol. albo striatis.

Le plus joli des Evonymus à feuilles panachées, feuilles oblongues, vert foncé au centre, tandis que le restant de la feuille est occupé par une large marge jaune-blanc . . . . 5 »

Evonymus jap. ovalis, fol. aureo varieg.

Large tache jaune au centre des feuilles, feuillage magnifique 5 »

Evonymus japonicus tricolor.

A feuilles moyennes d'un beau vert, maculées de jaune clair, de jaune plus foncé et quelquefois de blanc, *extra* . . 5 »

Evonymus radicans, fol. albo marginatis.

Feuilles d'un beau vert olive avec une large marge irrégulière blanc de neige au bord, panachure superbe . . . . . 4 »

Evonymus radicans, fol. ros. marg. (*Siebold*).

Très-joli . . . . 2 »

Kerria japonica, fol. argenteo varieg.

On possède le Kerria japonica dans tous les jardins, et voici certainement une variété nouvelle à feuilles bordées de blanc qui y fera sensation . . . . 3 à 6 »

Lonicera brachypoda, fol. aureo reticulatis.

Rien de plus riche que la panachure de cette plante, rien de plus charmant que ces lignes jaunes qui sillonnent les feuilles en tous sens comme un réseau d'or. . . . . 3 à 6 »

FRAISIERS NOUVEAUX.


Titien.

Fruit gros du plus beau coloris, chair blanche et solide, parfum des plus délicat. . . . . 1 »

Triomphe de Hollande (*Quatre saisons.*)

Remarquable nouveauté et excellente acquisition pour les amateurs de Fraises. Plante vigoureuse, d'une fertilité sans bornes (juillet à octobre), quatre fois plus productive que les autres fraisiers *des quatre saisons*. Le fruit très-gros est d'une couleur pourpre foncé vif au soleil, chair ferme d'un parfum on ne peut plus agréable . . . . 1 »

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.



ADENOCALYMNA racemosa 2 à 4 »
AESCHYNANTHUS cordifolius . 1 »
— fulgens . . . . 1 »
— Lowi . . . . 1 »
— Roxburghi . . . . . . 1 »
— splendidus . . . . . . 1 »
— Teysmanni . . . . . . 1 »
— tricolor . . . . 1 »
— zebrinus . . . . 1 »
AFZELIA discolor . . 10 à 20 »
AGATOPHYLLUM aromaticum . 5 »
ALLOPLECTUS Schlimi . . . 2 »
ALSTONIA macrophylla . . . 2 »
AMOORA Rohituka . . 3 à 5 »
AMPHILOBIUM Mutisi. . . . 1 »
ANAXAGORA javanica . . . 5 »
APHELANDRA Leopoldi . . . 1 »
— Porteana . . . . 1 »
— variegata. . . . . . . 1 »
ARALIA argentea. . . 10 à 20 »
— Browni . . . . . 2 à 4 »
— capitata . . . . 2 »
— Duncani . . . . . 5 à 10 »
— Ghiesbreghti (*voir page* 1) 20 »
— guatemalensis . . 2 à 4 »
— leptophylla . . . 3 à 6 »
— Lindeni (palmata). 2 à 4 »
— nymphœfolia. . . 2 à 4 »
— prœmorsa (HEDERA emarginata . . . . 2 »
— reticulata. . . . 2 à 4 »
— umbraculifera (PARATROPIA venulosa) . . . . 2 »
ARDISIA crenulata . . 1 à 2 »
— crispa (Sieboldi) . 1 à 2 »
ARISTOLOCHIA odoratissima . 1 »
— saccata . . . . 2 »
— Twaitesi . . . . . 2 à 4 »
ARTOCARPUS integrifolius *heterophylla* . . . . . 15 »
— Locucha . . . . 5 »
ASPARAGUS ruscifolius. . . 1 »
ASTRAPÆA Wallichi. . . . 2 »

BANISTERIA argentea . . . 2 »
— chrysophylla . . . . 2 »
BARBACENIA Rogieri. . 1 à 2 »
BEGONIA dœdalea, *longs pétioles couverts de longs poils colorés, et de belles macules rouges, portant des feuilles d'un vert porcelaine, brillant transparent, orné d'un fin réseau d'un beau brun, imitant les méandres d'un labyrinthe* . . . 3 »
— imperialis; *feuilles d'un beau brun devenant plus foncé par l'âge, tandis que les nervures sont largement bordées de chaque côté d'un beau vert, plante du meilleur effet.* 3 »
— Lascellizii; *magnifique* . 3 »
— longipila; *longs pétioles cylindriques, sillonnés rouge-brun, hérissés de nombreux et longs poils colorés, feuilles arrondies dans leur circonscription, mais profondément divisées en 7 à 9 parties, échancrées cordiformes à la base, à lobes pennatifides d'un vert sombre mat au dessus, mais à nervures très largement bordées de vert clair, en dessous le vert mat devient d'un beau rouge brun et les nervures jaunâtres. Plante magnifique et de premier ordre* . . . 3 »
— Sambo, *très joli* . . . 1 »
— Smaragdina, *feuilles ayant*

la même forme que l'impérialis, mais n'ayant pas de coloration brune. 3 »

Begonia **Collection** de cinquante des plus belles variétés, dont une partie des noms a été donnée dans notre dernier prix courant (1862) et que nous offrons à 0,50 pièce.
12 *variétés* pour 5 fr.

Bignonia Blumei, *à grandes fleurs jaune d'or* . . . 10 »
— buxifolia . . . . 1 »
— marmorata . . . . . . 2 »
— Pareira . . . . 2 »
— Rollisoni . . . . 2 »
Bleekeria calocarpa (Lactaria) . . . . 4 »
Blighia sapida . . . . . . 10 »
Boehmeria argentea . . . 1 »
Brexia chrysophylla . 1 à 3 »
— madagascariensis . 1 à 3 »
— serrata . . . . . 1 à 3 »
Brownea Ariza . . . 10 à 20 »
— capitellata . . . . . . 15 »
— coccinea . . . . 7 »
— erecta . . . . . . 15 à 30 »
— grandiceps . . . 10 à 30 »
— latifolia . . . . 10 à 20 »
— Léopoldi . . . . 75 »
— leucantha . . . . . . 20 »
— macrophylla . . . . . 20 »
— princeps . . . . 15 à 25 »
— racemosa . . . . 3 »
Calophyllum Calaba . . . 5 »
Calyptraria lœvigata. 10 à 20 »
Campylobotrys discolor . . 1 »
— Ghiesbreghti, *très-joli*. . 3 »
— pyrophylla . . . . . . 2 »
Canella alba . . . . . . 15 »
— laurifolia . . . . 15 »
Capparis flexuosa . . . . 2 »
Carapa discolor . . . . . 15 »
— procera . . . . . 20 à 30 »
Carludovica Liboni . 5 à 10 »
— palmata . . . . 6 »
— plicata . . . . . 2 à 6 »
Carolinea affinis . . 3 à 6 »
— alba . . . . . . 3 à 6 »
— campestris . . . . . . 7 »
— fastuosa . . . . 3 à 6 »
— macrocarpa . . . 3 à 6 »
— princeps . . . . 7 »
Cedrela chromatica . . . . 3 »
Cedrela febrifuga . . . . 5 »
— odorata . . . . 2 »
Cerbera fruticosa (Kopsia) (Calpicarpium Boxburghii) . . . . 2 »
— Tanghin . . . . 2 »
Chamberlaynia spectabilis 2 à 5 »
Chirita communis . . . . 1 »
— Mooni . . . . 1 »
— sinensis . . . . 1 »
Cissus discolor marmorata . 1 »
— porphyrophylla . . . . 3 »
— sp. Palembang (*voir p.* 2) 3 »
Clerodendron Bethunianum . 8 »
— calamitosum . . . . . 2 »
— cruentum . . . . 8 »
— kœmpferi . . . . 3 à 6 »
— macrophyllum . . 2 à 4 »
— splendens . . . 2 à 4 »
Clusia Humboldti . . 2 à 5 »
— superba . . . . 2 »
Coccoloba excoriata . 3 à 6 »
— macrophylla . . . . . . 4 »
— majestica . . . . 8 »
— nymphœfolia . . . . . 3 »
— uvifera . . . . 10 »
Coesalpinia echinata . . . 2 »
Coffea Moka. . . . . 1 à 3 »
Colea floribunda . . 3 à 6 »
Coleus Malabaricus . . . . 3 »
— scutellarioïdes rubra (*voir page* 2) . . . . 2 »
la douzaine, 15 »
— Verschaffelti *plante à feuillage du plus grand effet, très-convenable pour massifs pendant l'été* . . . . » 50
la douzaine, 5 »
Columnea erytrophœa . . . 1 »
— scandens . . . . 1 »
Combretum Pinceanum . . . 2 »
Conoclinium panamense . . 2 »
Cookia pinnata . . . . . 3 »
Cordia glomerata . . . . 3 »
— superba . . . . 4 »
Costus elegans . . . . . 1 »
— discolor . . . . 6 »
Cratoeva Tapia . . . . . 2 »
Crescentia cujete . . . . 8 »
— macrophylla . . . . 4 à 8 »
Crinum amabile; *fort* . . . 30 »
— capense . . . . 10 »
— crassifolium . . . . . 10 »
Croton discolor . . . . . 2 »

CROTON elegans . . . . . . 2 »
— longifolium *variegatum* 2 à 4 »
— pictum . . . . . 2 à 4 »
— variegatum . . . 2 à 4 »
CRYPTOLEPIS longiflora. . . 3 »
CUPANIA pandurœfolia . 3 à 6 »
CURATELLA imperialis, *très-fort* . . . . . . 200 »
CURCULIGO recurvata . . . 2 »
CURCUMA Amada. . . . . 2 »
— aromatica . . . . . 2 »
— longa . . . . 2 »
CUSPARIA febrifuga. . . . 12 »
CYCLANTHUS cristatus . 3 à 6 »
CYANOPHYLLUM magnificum 5 à 10 »
— speciosum . . . . . 10 »
CYPERUS alternifolius *albo var., largement rubané de blanc, très-convenable pour l'ornementation des pelouses pendant l'été* . 6 »
CYRTOCERAS floribunda. 1 à 2 »
DAMMARA orientalis . 5 à 50 »
— — *alba* . . . . 5 à 50 »
— — *extra fort, six mètres de haut* . . . . . 400 »
DASYLIRION Acrotriche. . . 10 »
DICHORISANDRA discolor . . 2 »
— ovata . . . . . . 1 à 2 »
— vittata *cuprea* . . . . 2 »
DIONOEA muscipula. . . . 5 »
DIOSCOREA discolor . . . . 1 »
— zebrina . . . . 1 »
DIOSPYROS argentea. . . . 5 »
— ebenum . . . . . 5 à 10 »
— Embryopteris . . 2 à 4 »
DIPTERACANTHUS Herbsti . . 1 »
DORSTENIA asarifolia . . . 1 »
— ceratosanthes . . . . 3 »
— fruticosa . . . . . . 2 »
DRACÆNA arborea *vera* 20 à 30 »
— — *Angustifolia* . 2 à 6 »
— Aubryana (thalioïdes) 25 à 50 »
— Cannaerti. . . . 30 à 50 »
— cannœfolia . . . 5 à 15 »
— cernua . . . . . 1 à 4 »
— Draco . . . . . . 3 à 15 »
— esculenta (brasiliensis) 3 à 6 »
— ferrea . . . . . 2 à 6 »
— — *versicolor* . . 2 à 6 »
— flexilis (angustifolia) . . 1 »
— Fontanesi. . . . 3 à 6 »
— fragrans *latifolia* . 5 à 10 »
— fragrantissima . . 3 à 6 »
— gracilis . . . . . 2 à 6 »
DRACÆNA Humboldti . 30 à 50 »
— longifolia. . . . 3 à 6 »
— marginata . . . 2 à 6 »
— — *latifolia* . . . 4 à 20 »
— nobilis . . . . . 3 à 10 »
— punctata . . . . 5 à 10 »
— rubra . . . . . . 2 à 4 »
— Rumphi, *fort* . . . . 30 »
— terminalis *siamensis* . . 12 »
— Sieboldi (maculata) . . 5 »
— umbraculifera . . 20 à 100 »
DURIO zebethinus . . . . 5 »
ECHEVERIA gibbiflora . 2 à 5 »
— oberosa . . . . . 1 à 1 »
ECHITES Harrisi . . . . . . 2 »
— nutans, *très-jolie* . . . 1 »
— paniculata . . . . . . 2 »
— picta . . . . . . 1 à 2 »
— urophylla. . . . . . 2 »
ELOEOCARPUS lanceolatus (MONOCERA grand.flora) . . 3 »
ERANTHEMUM leuconeurum . 1 »
— nervosum . . . . . . 1 »
— semperflorens . . . . 1 »
ERIOSTIGMA catalpœfolia . . 10 »
ERYTHROCHITON brasiliense 5 à 10 »
ERYTHROXYLON Jonghi . . . 5 »
EUCHARIS amazonica, *très-jolie* . . . . . 2 à 4 »
EUGENIA brasiliensis . 2 à 4 »
— malaccensis . . . 3 à 6 »
— Mitchelli (PITANGA) . . 2 »
— rubricaulis . . . . . . 1 »
— spectabilis . . . 2 à 4 »
EUPHORBIA splendens . . . 2 »
EUPHORIA Longan . . 2 à 4 »
EXOSTEMMA macrophylla . . 4 »
FAGROEA lanceolata . . 2 à 4 »
— monantha. . . . . . 10 »
— Tahitiensis . . . 7 à 15 »
— Zeylanica . . . 5 à 10 »
FICUS amazonica. . . 3 à 6 »
— barbata . . . . 1 »
— Cooperi . . . . 5 »
— diversifolia . . . . . 1 »
— elastica . . . . 1 à 3 »
— elliptica . . . . 1 »
— ferruginea . . . 2 à 4 »
— Léopoldi . . . . 5 »
— melastomoïdes . . 2 à 4 »
— Neumanniana . . . . 2 »
— pellucida . . . . . . 2 »
— religiosa . . . . . . 1 »
— rhododendrifolia . . . 1 »
— Roxburghia (ARTOCARPUS imperialis) . . . . . 2 »

Ficus subpanduræformis 2 à 4 »
Fimenaria platanifolia. . . 4 »
Franciscea eximia . . 2 à 5 »
— macrantha . . . . 3 à 6 »
Galipea macrophylla . 5 à 10 »
— odoratissima . . 5 à 10 »
Garcinia australis . . 2 à 4 »
— Cowa (Mangostana) de la Martinique . . . . . 5 »
— Gutta (Cambogia) . 10 à 20 »
— ovata . . . . . . 3 à 6 »
Gardenia citri-odorata. . . 2 »
— Devoniana . . . . . . 3 »
— hirsuta (Oxyanthus) . . 3 »
— Pinceana . . . . . 2 à 4 »
— Rothmanni . . . 2 à 4 »
— Stanleyana . . . 2 à 5 »
— Sherbourniæ. . . . . . 2 »
— Vogeli (africana) . 2 à 4 »
— Whitfieldi (maleifera) 2 à 4 »
Gastonia dentata . . 3 à 6 »
— lerata . . . . . . 3 à 6 »
— palmata . . . . . 3 à 6 »
Geissomeria aurantiaca . . 2 »
Genipa americana . . . . . 10 »
— sylvestris. . . . . 2 à 4 »
Geoffroya surinamensis . . 4 »
Gesneria Blassi. . . . . . 1 »
— bulbosa-lateritia . . . 2 »
— cinnabarina . . . . . . 1 »
— Donckelari . . . 3 à 6 »
— Duc de Brunswick . . . 2 »
— egregia . . . . 1 »
— gloxiniæflora . . 2 à 4 »
— Leichlini . . . . 1 »
— Léopoldi . . . . 2 »
— Miellezi . . . . 2 à 4 »
— refulgens. (*Voir page* 2.) 3 »
— zebrina splendens . 1 à 2 »
Gloxinia nouveaux. (*Voir page* 2.)
— Abel Carrière.
— Aug. Ender.
— C. L. Van der Straal.
— Carlo Malenchini.
— Caroline von Trefurt.
— Claude Lorrain.
— Ed. Pynaert.
— Ernst Benary.
— F. Puig.
— grandissima Rosalina.
— Karl Fellmann.
— Lady Harry Vane.
— Mac Nary.
— Mme A. Léon.
— — Céleste Winans.
Gloxinia Pierre van Eeckhaute.
— Prince Anat. Demidoff
— — de Metternich.
— Triomphe de Weigy.
Gloxinia erecta A. Bonnard.
— — Adamas oculata.
— — A. de Kunkler.
— — Camille Piotrowski.
— — Cap. Campanema.
— — Ch. Raes.
— — Cte F. Dydynski.
— — Donizetti.
— — Dsse de Brabant.
— — elegans.
— — Federico Mylius.
— — Gouverneur de Backer.
— — Karl Enke.
— — Lady Grosvenor.
— — Léon de Freminville.
— — Luigi Gullino.
— — Mme A. Lebris.
— — — A. Miellez.
— — — Desbordes Valmore.
— — — Chantin.
— — — Pommery.
— — — Thibaut.
— — Maria Paulowna.
— — Mars cœruleus.
— — Mis de St-Innocent.
— — Minas Geraes.
— — Oscar Chastel.
— — Phœbus
— — Pce de Ligne.
— — — de Talleyrand.
— — Psse Alice.
— — R. D. Wolterbeck.
— — Reine Steph. de Portugal.
— — Roi Ferd. de Portugal.
— — Rosalina.
— — rosea mutabilis.
— — Rex igneus.
— — Th. Lobb.
— — Victor Lemoine.
— — Wagneri.
Au choix la pièce . » 75
— *la douzaine* . 6 »
Gomphia Theophrasta . 7 à 30 »
Gordonia javanica . . . . . 1 »
Guarea trichiloïdes. . 3 à 6 »
Guaïcum officinale . . . . 10 »
Gustavia augusta . . . 2 à 4 »
Hoemanthus coccineus fort . 5 »
Hebeclinium atrorubens . . 5 »
Hechtia Ghiesbreghti (*v p.* 3). 15 »
— Karwinskyana, *fort* . . 50 »

HELICONIA metallica . . . 4 »
— psittacina. . . . . . . 3 »
— pulverulenta (farinosa) . 3 »
— species de Mirador . . . 5 »
HERITIERA Fomes . . . . 4 »
— macrophylla . . . . . . 4 »
HERNANDIA sonora . . . . 4 »
HETEROCENTRON glandulosum, *à fleurs blanches très-abondantes*. . . . . 5 »
— roseum . . . . 1 »
— subtriplinervium . . . . 2 »
HETEROTRICHUM macrophyllum 4 »
HEXACENTRIS Harrisi . . . 2 »
— mysorensis . . . . . . 1 »
— — lutea . . . . 1 »
HEYNICHIA maleoïdes . . . 1 »
HIBISCUS ferox . . . 4 à 8 »
— hybridus . . . . 1 »
— mutabilis pleno . . . . . 1 »
HIPPOMANE longifolia . 6 à 25 »
HOYA bella *de Veitch* . . . 1 »
— campanulata . . . . . . 2 »
— fraterna . . . . 2 »
— imperialis . . . . . . 2 »
— Liboni. . . . . 5 »
— Motoskei (rotundifolia) . 1 »
— orbicularis . . . . . . 2 »
— picta . . . . . . 1 à 3 »
— Rumphii . . . . 2 »
— Teysmanni . . . . . . 2 »
— suaveolens . . . . . . 2 »
— variegata . . . . 1 à 3 »
— Vriesiana. . . . . 2 à 4 »
HUFELANDIA pendula . 2 à 4 »
HURA crepitans . . . . . . 3 »
HYMENOEA Courbaril . . . 4 »
IMATOPHYLLUM cyrtanthiflorum 10 à 30 »
INGA alba grandiflora . . . 3 »
— ferruginea (superbiens) . 2 »
— Harrisi . . . . 2 »
— ligustrina. . . . . . . 1 »
— macrophylla . . . 2 à 4 »
— quassiæfolia . . . 2 à 4 »
IPOMÆA Leeari . . . . . 1 »
— tyrianthina . , ... 2 »
IXORA acuminiata *de Kew*. . 3 »
— — *de Veitch*. . . . . 3 »
— coccinea . . . . . 2 à 4 »
— javanica (speciosa). 2 à 4 »
JACARANDA floribunda (Warcewiczi). . . . . 2 »
JAMBOSA (EUGENIA) amplexicaulis . . . . 2 »
JAMBOSA cauliflora . . . . . 2 »
— formosa . . . . 4 »
— Korthalsi. . . . . . . 2 »
— malaccensis . . . 3 à 6 »
— orbicularis . . . . . . 3 »
JASMINUM ligustrinum . . . . 1 »
— Sambac Maid of Orléans . 1 »
JONESIA Asoca . . . . . . 10 »
— scandens . . . . 3 à 6 »
KOEMPFERIA zebrina. . . . 2 »
KLUGIA zeylanica (Notoniana). 1 »
KOHLERIA lanata. . . . . . 2 »
LAGETTA lintearia . . 3 à 6 »
LAURUS canella . . . . 2 à 6 »
— cinnamomum javanicum 2 à 10 »
— — Makoyanum . . 10 à 20 »
LEMONIA carnea . . . 2 à 4 »
— rosea . . . . . . 2 à 4 »
— spectabilis . . . . 2 à 4 »
LINDENIA rivalis . . . . . . 1 »
LITSÆA macrophylla . . . . 2 »
LOMATOPHYLLUM borbonicum . 10 »
LUCUMA deliciosa . . . 4 à 8 »
MAMMEA americana . . . . . 15 »
MANDIROLA lanata . . . . . 1 »
MANETTIA bicolor . . . . . 1 »
MANIHOT Aipi utilissima . . 1 »
MANGLIETIA glauca (MAGNOLIA) 2 à 4 »
MARCGRAVRIA dubia. . . . 2 »
MARANTA albo-lineata . . . 4 »
— argyræa . . . . 4 »
— capitata. . . . . 10 »
— coccinea floribunda. . . 4 »
— ornata. . . . . 5 »
— Porteana . . . . 4 »
— regalis . . . . 7 »
— sangninea . . . . 2 à 4 »
— Sellowi . . . . 3 »
— Warscewiczi. . . . 4 à 8 »
— zebrina . . . . . 2 à 6 »
MEDINILLA eximia (Sieboldi). 2 »
MELASTOMA atropurpurea . . 1 »
— Lobbii. . . . . 3 »
MEYENIA erecta . . . . . . 1 »
— alba . . . . 1 »
MICHEL'A Champaca. . 3 à 6 »
— oblonga . . . . . 3 à 6 »
MIKANIA speciosa . . . . . 1 »
— Verschaffelti (*voir p.* 3) . 10 »
— Warscewiczi . . . . . . 2 »
MONOCERA grandiflora (ELOEOCARPUS lanceolata) 3 »
MONOCHÆTUM Humboldtianum. 10 »
— sericeum multiflorum (*voir page* 3) . . . . . 2 »

MUSA Castilloni . . . . . . 10 »
— discolor . . . . 7 »
— Paradisiæ. . . . . . . 7 »
— rosacea . . . . 7 »
— zebrina . . . . 20 »
MYRTUS filifolia . . . . . . 3 »
— melastomoïdes . . . . . 2 »
— tomentosa . . . . . . 2 »
NAPOLEONA imperialis . 2 à 4 »
NEMATANTHUS ionema (Moreli). 1 »
NEPENTHES ampullacea . . . 40 »
— lævis . . . . 8 »
— Rafflesiana . . . . . . 40 »
NERINE Cannaerti . . 10 à 20 »
NIPHÆA rubida . . . . . . 1 »
NORANTEA guyanensis. . . 1 50
OLDFIELDIA africana. . . . 8 »
ONCOSTEMON macrophyllum . 8 »
OREOPANAX dactyfolium . . 20 »
ORMOSIA emarginata . . . 15 »
— superba . . . . 20 »
PACHYSTIGMA pteleoïdes . . 2 »
PANAX fruticosum (ARALIA) 3 à 6 »
PANDANOPHYLLUM humile . . 15 »
PARATROPIA elliptica . 30 à 60 »
— farinifera . . . . . 6 à 12 »
— junghuneana. . . . 2 à 4 »
— longifolia. . . . . 20 à 40 »
— pulchella . . . . . 10 à 20 »
— scandens . . . . 2 »
— Teysmanni . . . . . . 2 »
— venulosa (ARALIA umbraculifera). . . . . . 2 »
PASSIFLORA actinia . . . . . 2 »
— amabilis . . . . 2 »
— Beloti . . . . 1 »
— cinnabarina . . . . . . 2 »
— Cte de Woronzow . . . . 1 »
— Decaisneana . . . . . . 1 »
— Kermesina . . . . . . 1 »
— — *major*. . . . . . . 2 »
PENTAS carnea rosea . . . . 1 »
PEPEROMIA maculata . . . . 3 »
PHRYNIUM cylindricum. . . 2 »
PHYLLAGATHIS rotundifolia, *plante magnifique par son feuillage* . . . . 3 »
PILOCARPUS pinnatifidus . . 8 »
PINCENECTITIA (BEAUCARNEA) glauca . . . . . . 10 »
— — *extra fort* . . . . 500 »
— tuberculata . . . . . 15 »
PIPER cubeba. . . . . . . 1 »
— flagellæ . . . . 2 »
PITHECOLOBIUM latifolium . . 2 »

PLOCOSTEMMA lasianthum . . 10 »
POGONANTHERA reflexa . . . 4 »
POGOSTEMON Patchouli . . . 1 »
POLLIA purpurea, *extra* . . 3 »
POLYGALA Hilariana. . . . 3 »
POSOQUERIA longiflora . 3 à 6 »
— platyphylla (spectabilis) . 5 »
PSYCHOTRIA leucocephala 5 à 10 »
— magnoliefolia . . 5 à 10 »
PTEROSPERMUM acerifolium 3 à 6 »
PUTZEYSIA rosea. . . 3 à 6 »
RHOPALA autralis . . . . 15 »
— Caleyi. . . . . 5 »
— complicata . . . 3 à 6 »
— corcovadensis . . 4 à 15 »
— crenata . . . . 15 »
— heterophylla . . . 4 à 12 »
— Jonghi. . . . . 15 à 30 »
— magnifica. . . . . . . 10 »
— montana elegans . . . 3 »
— organensis . . . 4 à 12 »
— Porteana . . . . 10 »
— princeps . . . . 10 »
— Skinneri . . . . 12 »
RIVINIA tinctoria. . . . . 1 »
— octendra . . . . 1 »
RHYNCHOSIA albo-nitens. *C'est certainement une des plus jolies plantes grimpantes, ses fleurs, disposées en grappes, sont très-abondantes et d'un beau violet mauve. Ses feuilles sont coupées au centre par une large bande blanche.* . 2 »
RONDELETIA speciosa . . . 2 »
ROUPELIA grata. . . . . 1 »
RUSSELLIA juncea . . . . . 1 »
— polyedra (semperflorens). 1 »
SANSEVIERA fasciata. . 4 à 8 »
SAURAUJA macrophylla. . . 3 »
— mollis . . . . 3 »
SAUROPUS Gardneri. . . . 5 »
SCHIMA superba . . . . . . 2 »
SCIADOCARPUS Brongniartii . 8 »
SIMABA ferruginea . . . . . 25 »
SIMARUBA excelsa . . 5 à 10 »
SINNINGHIA gloxiniæflora . . 1 »
SMILAX marmorea *du Ceylan*. 2 »
SOLANUM argyræa . . . . . 1 »
— atropurpureum . . . . . 1 »
SONERILA alba . . . . . . 3 »
— — nova . . . . 3 »
— margaritacea superba . . 5 »

SORINDEIA madagascariensis . 5 »
SPATHODEA campanulata. 2 à 4 »
— gigantea . . . . 5 à 6 »
— speciosa (lævis). . 5 à 6 »
SPHÆROSTEMMA marmorata . 15 »
STADMANNIA Estrellensis 10 à 20 »
— Frazeri . . . . . . 10 »
— Jonghii . . . . 7 à 15 »
— pubescens (rugosa). . . 40 »
STEPHANOPHYSUM Baikeri . . 1 »
STEPHANOTIS floribunda . . 2 »
— Thouarsi . . . . . . 2 »
STERCULIA inops. . . . . 8 »
— mexicana. . . . . . 8 »
— villosa. . . . . . . 20 »
STROMANTHE sanguinea (MARANTA) . . . . 2 à 4 »
SWARTZIA Fleminghii . . . 8 »
— Longsdorffii . . . . . 10 »
SWIETENIA Mahagoni . . . 20 »
TACSONIA ignea . . . . . 2 »
TALAUMA candollei (MAGNOLIA odoratissima) . . 5 à 6 »
— fragrantissima (ovata). . 15 »
— mutabilis . . . . 5 à 6 »
— Plumieri . . . . 15 »
TAPINA splendens . . . . 1 »
TERMINALIA mollis . . . . 25 »
THEOBROMA cacao . . . . 20 »
THEOPHRASTA glauca . 8 à 15 »
— lanceolata . . . . . 50 »
— latifolia . . . . 5 à 15 »
— macrophylla, *vera* . . . 20 »
— ocanensis (minor) . 4 à 8 »
THIBAUDIA acuminata (macrophylla) . . . . . . 4 »
— pubescens . . . . . 5 »
THUMBERGIA natalensis. . . 2 »
THYRSACANTHUS barlerioïdes . 1 »
— rutilans . . . . . . 2 »
TRADESCANTIA discolor vittata (lineata). . . . . . 2 »
TRYALLIS brachystachis . . 1 »
TYDOEA Beauty . . . . . . » 75
— Chauvieri. . . . . . 1 »
— Christiana . . . . . 1 »
— ignescens. . . . . . » 75
— Luciata . . . . . . 1 »
— multiflora. . . . . . 1 »
— Rougieri . . . . . . 1 »
Plus une collection des VINGT PLUS BELLES variétés, à 0,50 pièce, la douzaine. 5 »
URVILLEA ferruginea . . . 5 »
UVARIA argentea. . . . . 8 »
VALLEZIA Pao-pareiro . . . 8 »
VILLAREZIA grandifolia. . . 2 »
XANTHOCHIMUS ovalifolius . . 15 »

AROÏDÉES.

ALOCASIA metallica (*Hook*). 30 à 50 »
ANTHURIUM amplum. . 10 à 25 »
— Augustinum . . . 7 à 15 »
— Beyrichianum . . . . 4 »
— cordatum . . . . 4 à 10 »
— Erythropodium . . . . 5 »
— fissum . . . . . 7 à 15 »
— Galeottianum. . . 4 à 8 »
— glaucescens . . . 7 à 15 »
— Hookeri . . . . 5 à 10 »
— Humboldti (cardiophyllum) 7 à 15 »
— intermedium . . . 6 à 12 »
— Jonghi . . . . . 5 à 6 »
— leuconeurum. . . . . 30 »
— lucidum . . . . 4 à 8 »
— membranuliferum . 10 à 20 »
— Olfersianum . . . . . 20 »
— rubricaule. . . . 7 à 15 »
— signatum . . . . 7 à 15 »
— Warscewiczi. . . . . 5 »
ARIOPSIS peltata . . . . . 5 »
ATACCIA cristata (TACCA integrifolia) . . . . 15 à 30 »
— pinnatifida (TACCA). 7 à 15 »
CALADIUM albicans . . . . 10 »
— argyrites . . . . . . 5 »
— Lemaireanum . . . . 8 »
— albo-punctatissimum . . 3 »
— Belleymi . . . . . . 4 »
— bicolor. 1 50
— — superbum. . . . . 4 »
— Brongniarti . . . . . 2 »
— Cannaertii (*voir page* 2). 10 »
— Chantini . . . . . . 3 »
— Enkeanum . . . . . 7 »
— hastatum . . . . . . 2 »
— Laucheanum . . . . . 5 »
— Lowi (ALOCASIA) (*v p.* 1) 30 à 50 »
— marmoratum (thripedestum) 2 »
— metallicum. . . . 3 à 6 »
— Neumanni. . . . . . 5 »
— Osyanum . . . . . . 10 »

CALADIUM pæcile. . . . . 3 »
— picturatum . . . . . . 2 »
— regale. . . . . 8 »
— rubricaule . . . . . . 2 »
— Schillerianum . . . . 10 »
— Smitzii. . . . . 4 »
— Schœlerii. . . . . . . 8 »
— splendens. . . . . . . 3 »
— splendidum . . . . . . 10 »
— Verschaffelti. . . . . 3 »
— Wighti. . . . . 4 »
COLOCASIA albo-violacea, *magnifique, les petioles, très-bien panachés de blanc et de violet clair* . . . . 10 »
— cærulescens, *très-belle espèce de l'Amazone, très ornementale et très-convenable pour l'ornementation des jardins. Les feuilles d'un vert bleuâtre atteignent de grandes dimensions* . . 5 »
HÆMALONEMA rubra . . 2 à 4 »
MASSOWIA cannæfolia . . . 3 »
MONSTERA dimidiata (PHILODENDRON hederaceum) . 3 »
— Lennei (deliciosa) . 7 à 15 »
PHILODENDRON asperatum 4 à 8 »
— bipinnatifidum . . . . 30 »
— cannæfolium . . . . . 4 »
— crinipes . . . . . . 5 »
— elegans . . . . 7 à 15 »
— eximium . . . . 4 à 8 »
— fenestratum . . . . . 3 »
— Fontanesi . . . . 5 à 15 »
— giganteum . . . 4 à 8 »
— Imbe . . . . . . 5 à 10 »
— pinnatifidum . . . 7 à 15 »
— quercifolium (lacerum) . 3 »
— Riedelianum . . . . . 8 »
POTHOS argyræa . . . . . . 1 »
SOLENOSTERIGMA discolor . . 2 »
SPATHIPHYLLUM Fredericksdali 10 »
— lanceolatum . . . . . 10 »
SYNGONIUM auritum . . . . 2 »

BROMÉLIACÉES.

ÆCHMEA cœlestis . . . . . 3 »
— corallina . . . . 6 »
— distichanta . . . . . . 8 »
— farinosa (agglomerata). . 5 »
— fulgens . . . . 5 »
— — *discolor* . . . 3 à 6 »
— Melinoni . . . . 4 »
— miniata *discolor*. . 3 à 6 »
— rosea . . . . 3 »
— spectabilis . . . . . 7 »
— Weilbachi. . . . 4 à 8 »
BILLBERGIA amœna . . . . 2 »
— fasciata . . . . 4 à 8 »
— Glymiana . . . . . . 10 »
— iridifolia . . . . . . 2 »
— Leopoldi . . . . 4 à 8 »
— Liboniana . . . . . . 2 »
— Lowi . . . . 10 »
— miniata rosea . . 4 à 8 »
— Moreliana. . . . . . . 5 »
— pyramidalis bicolor. 2 à 4 »
— splendida . . . . 3 à 6 »
— thyrsoïdea . . . 3 à 6 »
— Wioti . . . . 10 »
— zebrina . . . . . 4 à 8 »
BROMELIA sceptrum. . . . 10 »
CARAGUATA splendens . . . 3 »
DISTEGANTHUS basilateralis . 4 »
DYCKIA ramosa . . . . . 3 »
— remotiflora . . . . . 1 »
ECHINOSTACHYS Pineliana . . 4 »
ENCHOLIRION Jonghi, *fort* . . 30 »
NIDULARIUM fulgens. . . . . 8 »
— Innocenti . . . . . . 40 »
— princeps (Para). . . . 30 »
— Scheremeteffi . . . . 12 »
PITCAIRNEA Gireoudiana . . 4 »
— leiolena . . . . . . 2 »
— undulata . . . . . . 2 »
PORTEA kermesina . . . . 8 »
POURRETIA floccosa . . 6 à 12 »
PUJA Funckiana . . . . . 2 »
— maïdifolia . . . . . 2 »
— recurvata. . . . . . 1 »
TILLANDSIA acaulis . . . . 1 »
— dianthoïdea . . . . . 20 »
— bi-vittata . . . . 5 à 10 »
VRIESIA psittacina . . 4 à 8 »
— speciosa (*Tillandsia* splendens) . . . . . . 3 »

ORCHIDÉES.

Acantophippium bicolor 5 à 10 »
Aerides affine . . . 30 à 50 »
— — rubrum . . . 40 à 75 »
— crispum . . . . 40 à 100 »
— Fieldingi . . . . 75 à 150 »
— Lindleyanum, *fort* . . 150 »
— Lobbi . . . . 100 à 150 »
— odoratum (cornutum) 7 à 30 »
— — *très-forte* . . . 150 »
— — *majus* . . . 20 à 40 »
— — *niveum* . . . 20 à 40 »
— — *purpurascens* . 20 à 40 »
— quinquevulnerum . . 100 »
— suavissimum. . . 50 à 150 »
— virens. . . . . 50 à 100 »
— — *superba* . . . . 100 »
Angroecum Apiculatum . . 30 »
— bilobum . . . . 20 »
— eburneum . . . 50 à 100 »
Anguloa Clowesi . . . . 40 »
Brassavola glauca. . . . 10 »
Brassia Boissieri . . 8 à 15 »
— brachiata. . . . 15 à 25 »
— caudata . . . . . . 20 »
— guttata . . . . 8 à 15 »
— maculata . . . . 5 à 10 »
— verrucosa . . . . 5 à 15 »
— Wagneriana . . . 8 à 15 »
Calanthe Domini . . . . 25 »
— Veitchi. . . . . 40 à 75 »
— vestita . . . . 15 à 30 »
Cattleya amethystina. 15 à 50 »
— — punctata . . . . . 40 »
— Arembergi. . . . . . 30 »
— concolor . . . . 30 à 50 »
— Elisabethæ . . . . 100 »
— guttata . . . . 15 à 30 »
— ianthina . . . . 25 à 50 »
— labiata. . . . . 30 à 60 »
— — *atropurpurea* . . 100 »
— lobata. . . . . . . 60 »
— Mossiæ. . . . . 10 à 40 »
— — *superba* . . . 15 à 40 »
— mutabilis. . . . 15 à 30 »
— Skinneri . . . . 30 à 60 »
— — *splendens*. . . 50 à 100 »
— Wagneri . . . . 40 »
Coelia macrostachya . . . . 8 »
Cælogyne fimbriata . . . 10 »
— fuliginosa. . . . . . . 4 »
— intermedia . . . . . 10 »

Cymbidium elegans . . . . . 15 »
— ensifolium . . . . . . 5 »
— iridifolium . . . 5 à 10 »
— finlaysonianum . . . . 15 »
— pendulum. . . . . . . 10 »
Cypripedium barbatum . 7 à 20 »
— superbum. . . . 10 à 25 »
— Fairienum . . . . . . 30 »
— hirsutissimum . . . . 50 »
— insigne . . . . . 2 à 6 »
— Hookeri . . . . 80 »
— Javanicum . . . . . . 15 »
— venustum. . . . 3 à 6 »
Cyrtochilum hastatum. 7 à 15 »
— leucochilum . . . 7 à 15 »
— maculatum . . . 7 à 15 »
Cyrtopodium punctatum . . 15 »
Dendrobium calceolaria. 10 à 30 »
— Cambridgeanum. . 20 à 40 »
— Dalhousienaum . . 60 à 150 »
— densiflorum . . . 25 à 75 »
— Farmeri . . . . 30 à 60 »
— — album. . . . 50 à 100 »
— Griffithi . . . . 30 à 100 »
— nobile . . . . . 7 à 15 »
Disa grandiflora . . . 30 à 50 »
Epidendrum aurantiacum 7 à 15 »
— macrochilum *album* . . 30 »
— Stamfordianum . . 10 à 20 »
Eria stellata . . . . 5 à 10 »
Eriopsis rutidobulbon . . . 20 »
Lælia anceps . . . 10 à 20 »
— — *Barkeriana* . . 15 à 30 »
— crispa . . . . . 15 à 40 »
— Flava . . . . 40 »
— Perrini . . . . 20 à 40 »
— — majus. . . . . . 40 »
— — purpurata . . 30 à 100 »
Limatodes rosea. . . 15 à 30 »
Lycaste aromatica . . 6 à 12 »
— fulvescens. . . . 7 à 15 »
— macrophylla . . . 5 à 15 »
— Skinneri . . . . 15 »
Maxillaria gracilis . . . . 5 »
— porrecta . . . . 7 »
— tenuifolia. . . . 5 à 10 »
Miltonia bicolor . . 15 à 25 »
— candida . . . . 20 »
— Clowesiana . . . . . . 20 »
— — *major*. . . . . . 20 »
— Moreliana. . . . 15 à 50 »

Miltonia spectabilis . 10 à 20 »
Odontoglossum bictoniense . 20 »
— citrosmum . . . . . . 15 »
— grande . . . . 15 »
— lœve . . . . 15 »
— pulchellum *grandiflorum*. 8 à 15 »
Oncidium altissimum . 5 à 20 »
— Carthagenense . . 5 à 10 »
— flexuosum . . . . . . 10 »
— intermedium. . . . . 10 »
— Papilio . . . . 15 »
— — *majus*. . . . . . 15 »
— sphacelatum . . . 5 à 20 »
Phajus grandifolius . 10 à 20 »
— maculatus . . . . 7 à 20 »
Phaloenopsis grandiflora . . 75 »
— — *varietas* . . . . 100 »
Pogonia Nervilli. . . 8 à 15 »
Renanthera coccinea . 5 à 20 »
Saccolabium Blumeï . . . 75 »
— — *majus* . . . . 100 »
— papillosum . . . . . 10 »
— retusum . . . . 75 à 125 »
— — *superbum* . . 75 à 150 »
Sarcanthus paniculatus . . 15 »
— rostratus . . . . 5 à 10 »
Schomburgkia crispa . 20 à 40 »
— marginata . . . 20 à 40 »
— rosea . . . . . 20 à 40 »
Schomburgkia undulata 20 à 40 »
Sobralia macrantha . 15 à 30 »
— — *splendens* . . . . 30 »
Stanhopea aurantia . 7 à 15 »
— Devoniensis . . . 7 à 15 »
— graveolens . . . 7 à 15 »
— insignis . . . . 7 à 15 »
— oculata . . . . 5 à 10 »
— saccata . . . . 5 à 10 »
— tigrina. . . . . 7 à 15 »
— venusta . . . . 7 à 15 »
— Wardi . . . . . . 7 à 15 »
Trichopilia suavis . . 25 à 40 »
— tortilis. . . . . 7 à 15 »
Trichotosia ferox . . 7 à 15 »
Vanda furva . . . . 10 à 20 »
— multiflora . . . 7 à 15 »
— Roxburghi . . . 40 à 80 »
— — *cœrulea* . . . 40 à 80 »
— suavis *Rollisson*. . 75 à 250 »
— — *de Veitch*. . . 75 à 300 »
— teres . . . . . 7 à 15 »
— — *gigantea* . . . . . 75 »
— tricolor . . . . 50 à 200 »
— — *formosa* . . . 75 à 200 »
— — *superba* . . . 75 à 150 »
Vanilla africana . . . . 4 »
— aromatica. . . . 2 à 5 »
Zygopetalum crinitum . . . 10 »
— Makaï . . . . 10 »

CYCADÉES.

Cycas circinalis . . . 20 à 400 »
— — *extra fort* . . . 1000 »
— revoluta . . . . 5 à 20 »
— — *très-fort* . . . . 500 »
— Rumphi (Ruminiana) 30 à 100 »
Zamia eriolepis (gigas) . . 30 »
— horrida . . . . . . 40 »
— muricata . . . . 10 à 100 »
— — *picta* . . . . 25 »
— Skinneri (Lindleyana) . . 75 »

PALMIERS.

Acrocomia Sclerocarpa. 15 à 30 »
Areca alba, *vera* . . 4 à 10 »
— Catechu . . . . 40 »
— lutescens (Hyaphorbe indica). . . . . 10 à 50 »
— — *extra fort*. . . . 500 »
— madagascariensis . 30 à 50 »
— rubra . . . . . . 2 à 100 »
— speciosa . . . . 20 à 40 »
— Verschaffelti . . . . 200 »
Arenga saccharifera . 20 à 250 »
Astrocaryum Chicon . 30 à 50 »
— rostratum (mexicanum). 15 à 300 »
Attalea Cohune . . . . 30 »
Attalea maracaïbensis 5 à 20 »
Bactris flavispina . . 20 à 40 »
Calamus asperrimus . 50 à 100 »
— assamicus. . . . 50 à 300 »
— ciliaris. . . . . 20 à 50 »
— coronarius . . . . . 75 »
— Draco . . . . . 50 à 100 »
— micranthus . . . 15 à 75 »
— montanus, *très-fort* . 400 »
— oblongus (niveus) . 50 à 200 »
— Rotang . . . . 30 »
— Rung-Dung . . . 20 à 30 »
— tenuis . . . . . 20 à 50 »
— Verschaffelti . . . . 100 »
— viminalis . . . . 50 à 200 »

CARYOTA excelsa. . . 10 à 100 »
— Rumphi . . . . 25 à 40 »
— urens . . . . 5 »
CEROXYLON niveum (DIPLOTHEMIUM caudescens). 50 à 100 »
CHAMOEDOREA atrovirens . . 20 »
— Demanniana . . . 10 à 20 »
— Ernestia Augusti (simplicifrons) . . . . 40 »
— fenestrata (GEONOMA) . . 30 »
— gracilis . . . . 10 à 30 »
— lepidota (elegans) (venulina) . . . . 6 »
— Sartori. . . . . 5 à 20 »
— Schiedeana . . . 5 à 30 »
CHAMOEROPS Ghiesbreghti 10 à 30 »
— Martiana . . . . . 100 »
— stauracantha. . . 6 à 40 »
COCOS Fernambucensis. . . 25 »
— lapidea . . . . 40 »
COPERNICIA Miraguana. 10 à 20 »
CORYPHA australis (LIVISTONIA). . . . . . 8 à 20 »
— — *extra fort* . 500 à 1200 »
— Guanacoa. . . . 50 à 100 »
DOEMONOROPS spectabilis *fort*. . . . 100 à 150 »
DIPLOTHEMIUM campestre *extra fort* . . . . 1000 »
— maritimum . . . 30 à 100 »
DRYMOPHLÆUS Zippelii . 20 à 40 »
GEONOMA Ghiesbreghti. 5 à 30 »
— pinnatifrons . . . . . 30 »
— Verschaffelti. . . . . 10 »
GUILLIELMA speciosa . . . 40 »
LATANIA borbonica . . 3 à 300 »
— — *extra fort* . . . 800 »
LATANIA glaucophylla . . . 60 »
— rubra . . . . . . 100 »
LICUALA elegans. . . 20 à 40 »
— spinosa . . . . 15 à 40 »
LIVISTONIA Jenkinsoni . 10 à 50 »
— olivæformis . . . 5 à 40 »
— rotundifolia (SARIBUS) 30 à 60 »
MARTINEZIA caryotæfolia 40 à 80 »
MAXIMILLIANA regia . 10 à 150 »
OREODOXIA Sanchona. 40 à 500 »
PHOENIX farinifera . . 20 à 300 »
— leonensis. . . . 20 à 300 »
— Sylvestris. . . . 20 à 200 »
PINANGA latisecta *très-fort*. 250 »
PLECTOCOMIA spectabilis 150 à 500 »
PTYCHOSPERMA appendiculata 50 à 100 »
— Javanica . . . . 50 à 100 »
SABAL Blackburneana *vera*, *très fort*. . . . . 800 »
— glaucescens . . . . . 20 »
— mexicana. . . . . . 30 »
— umbraculifera . . . . 40 »
SEAFORTHIA elegans . 20 à 100 »
— — *extra fort* . . . 800 »
STACHYOPHORBE Deckeriana. 30 »
THRINAX argentea *fort*. 100 à 200 »
— barbadensis, *magnifique et très fort*. . . . 1500 »
— elegans. . . . 6 à 30 »
— graminifolia . . . 50 à 100 »
— tunicata . . . . 30 »
TRITHRINAX mauritæformis 10 à 30 »
WALLICHIA caryotoïdes *fort* . 75 »
— porphyrocarpa (ORANIA regalis). . . . . . . 30 »

PANDANÉES.

FREYCINETIA nitida. . 7 à 15 »
PANDANUS amaryllifolius 7 à 15 »
— bagea . . . . 40 »
— caricosus. . . . 4 à 12 »
— elegantissimus . . . . 12 »
— furcata, *fort*. . . . 100 »
PANDANUS graminifolius 2 à 6 »
— javanicus *fol. var.* . 6 à 20 »
— latissimus . . . . 100 »
— — *extra fort* . . . 500 »
— utilis . . . . . . 10 à 100 »
— — *très fort* . . . . 300 »

FOUGÈRES.

ACROSTICHUM viscosum. . . 2 »
ADIANTUM concinum . . . 1 »
— curvatum . . . . . . 2 »
— formosum . . . . . 1 »
ADIANTUM pentadactylon . . 2 »
— sanctæ Catherinæ . . . 4 »
— trapeziforme . . . . . 2 »
— tetraphyllum. . . . . 2 »

ANGIOPTERIS evecta . . 20 à 40 »
— gigantea . . . . 20 à 50 »
— hypoleuca . . . 20 à 50 »
— longifolia . . . 20 à 75 »
— pruinosa . . . . 20 à 50 »
— Willincki . . . . 10 à 30 »
ASPLENIUM Belangeri . 1 à 5 »
— caudatum. . . . 2 à 5 »
CIBOTIUM glaucescens . 2 à 4 »
CYRTOGONIUM repandum . . 2 »
DICTYOGLOSSUM crinitum 7 à 15 »
DIPLAZIUM elegans . . . . 7 »
— Shepherdii . . . 2 à 4 »
DORYOPTERIS grande . 15 à 35 »
DRYNARIA coronans. . 2 à 5 »
— diversifolia . . . 2 à 4 »
GLEICHENIA dichotoma . . . 4 »
GONIOPHLEBIUM Renwardti 3 à 5 »
— sub-auriculatum . 3 à 5 »
GYMNOGRAMMA gracilis *varietas* . . . . 2 »
— — *monstrosa* . . . . 10 »
— lanata 1 50
— Laucheana 1 50
— luteo alba . . . . . 1 »
— Stelzneri *fort* . . . . 20 »
GYMNOPTERIS nicotianæfolia . 2 »
LONCHITIS Ghiesbreghti. . . 3 »
LYGODIUM circinatum. . . . 3 »
MARATTIA macrophylla. . . 20 »
— mycrophylla . . . . . 20 »
OLEANDRA hirtella . . . . . 1 »
PLATYCERIUM alcicorne . . 1 »
POLYPODIUM ericoïdes . . . 1 »
PTERIS argyrœa. . . . . . 1 »
— cretica albo-lineata. . . 1 »
— nemoralis *fol. var.* . . 15 »
SAGENIA decurrens *fort*. . . 6 »


FOUGÈRES EN ARBRES.

ALSOPHILA australis. . 5 à 30 »
— contaminans. . . . . 25 »
— Lambinoni . . . . . 15 »
— radens. . . . . 15 à 30 »
CIBOTIUM princeps . . 15 à 30 »
— Schiedeï *extra fort*. . 700 »
TODEA pellucida . . . 15 à 30 »

LYCOPODIACÉES.

SELAGINELLA apotheca. . . 1 »
— atroviridis . . . . . 1 »
— cœsia . . . . » 50
— — arborea . . . . . 1 »
— circinalis. . . . 1 à 2 »
— conferta . . . . . . 2 »
— Dichrous . . . . . . 1 »
— Griffithi . . . . . . 2 »
— Lobbi . . . . 1 »
SELAGINELLA Lyalli. . . . 4 »
— obtusa. . . . . . . 1 »
— paradoxa . . . . . . 2 »
— rubricaulis . . . . . 1 »
— umbrosa . . . . 1 à 2 »
— viticulosa . . . . 1 à 2 »
— Wallichi . . . . 1 à 3 »
— Wildenowi . . . . . 1 »

SERRE FROIDE ET ORANGERIE.



ABUTILON (*voir page* 5)
ACACIA cordata . . . . . . 1 »
— cultriformis . . . 2 à 5 »
— Drummundi *vera* . 4 à 8 »
— eriocarpa. . . . . . . 6 »
— Glymi . . . . 4 »
— lanuginosa . . . 3 à 6 »
— Latrobei . . . . 1 à 3 »
— Oleïfolia *elegans* . . . 3 »
— proeminens . . . . . . 4 »
— pubescens, *fort* . . . . 12 »
— pulchella *cycnorum* 3 à 6 »
— — *grandis* . . . . . . 5 »
— rotundifolia . . . . . 2 »
— Seymourei, *magnifique* . 10 »
— ulicina . . . . 1 à 3 »
ACRADENIA Franklini . . . 2 »
ADAMIA versicolor . . . . 1 »
AGATHEA cœlestis *fol. var*. . 1 »
AGERATUM cœlestinum *fol. var*. » 50
AGNOSTUS sinuatus (STENOCARPUS Cunninghami). 4 à 30 »
— — *integrifolius*. . 4 à 30 »
ARALIA crassifolia . . 3 à 20 »
— Ghiesbreghti (*v. p.* 1) . . 20 »
— heteromorpha . . . . 7 »
— integrifolia . . . 3 à 5 »
— papirifera. . . . 1 à 3 »
— quinquefolia . . . 3 à 10 »
— Sieboldi (FATZIA japonica 4 à 8 »
— Standishi. . . . . . . 15 »
— trifoliata . . . . 3 à 20 »
ARBUTUS californica. . . . 3 »
— Menziesi . . . . . . 3 »
ASPALATUS sericeus (argyrœa) 1 »
ASPIDISTRA angustifolia, *fol. var*. . . . . 5 »
AZALEA indica Baronne Pycke (*Vers*.) *dans le genre de Azalea, Souvenir de l'exposition, mais beaucoup mieux fait* . . . 5 à 10 »
— — Charles Enke (*Vers.*) *fleur rose pâle à bords blancs striés de violet* 2 à 5 »
AZALEA indica Dieudonné Spae (*Vers.*) *fleurs nombreuses et très-grandes, fond blanc pur relevé de rose vif du centre jusque près du sommet du limbe, bordé de blanc, sur lequel le rose s'étale comme à coups de pinceau; à la gorge, une sorte d'anneau cocciné, en haut, des macules en forme d'accents circonflexes, cramoisi foncé; feuilles grandes* 2 à 5 »
— — Duc d'Aremberg (*Vers.*) *forme parfaite, fond blanc, relevé et vergeté de rose, orné en outre de très-larges stries écarlates, disposées comme dans les œillets flamands, à la base du lobe supérieur, une belle macule coccinée avec accents circonflexes cramoisi foncé.* 2 à 5 »
— — Grand duc Michel (*Versch.*) *Très grande fleur double d'un très-beau rose, d'un très-bel effet, floraison abondante et facile.* . . . 2 à 5 »
— — Madame Verschaffelt (*Versch.*) *Fleur grande, d'un blanc lavé de rose assez vif, strié ou même mi-partie (chaque lobe) de cramoisi, riche teinte qui enrichit la base du lobe supérieur et la moitié de celle des deux latéraux, en même temps qu'elle est parsemée d'accents circonflexes d'un beau noirâtre sombre. En outre, tout les lobes, for-*

tement ondulés aux bords, sont marginés de blanc; les étamines et le style coccinés, ainsi que les veines très-apparentes qui sillonnent le fond. C'est sans contredit la plus belle variété dans cette catégorie. Floraison très abondante. 3 à 5 »

AZALEA indica Mme Wagner (*Versch.*) (*voir p. 4*). 7 à 15 »

— — Souvenir de Miellez (*Versch*). *Dans le genre de Azalea Roi Léopold, mais plus orangé avec un fond plus pâle.* . 2 à 5 »

— — William Bull (*Versch*). (*voir page 4*) . . 7 à 15 »

BAMBUSA Fortunei fol. niveo. vittatis (*voir page 8*). . 10 »

BANKSIA Cunninghami . 4 à 8 »

— integrifolia . . . 3 à 6 »

— latifolia. . . . . 2 à 6 »

— spinulosa. . . . 4 à 8 »

BEAUFORTIA splendens, *magnifique* . . . . 4 »

BERBERIS trifoliata . . . . 2 »

BESCHORNESIA Yuccoïdes *très-fort* . . . . 30 »

BLANDFORDIA flammea . . . 6 »

— longiflora. . . . . . 7 »

BORONIA viminea. . . . . 2 »

BOUVARDIA longiflora . . . 1 »

BUXUS citrifolia . . . . . . 2 »

CALCEOLARIA Ætna . . . . 1 »

— amplexicaulis *pallida*. . 1 »

— aurea floribunda . . . 1 »

— canariensis . . . . . . 2 »

— Little Dorrit . . . . . 1 »

— Princesse Hélène . . . 1 »

— Sparkler . . . . 2 »

CALLICARPA purpurea . . . 1 »

CAMPANULA hirsuta . . . . 1 »

— fragilis . . . . 1 »

CANNA. *Plantes à grand effet que nous ne pouvons trop recommander, groupées en massifs ou isolées dans les jardins; elles y produisent un effet ravissant par leur végétation toute tropicale.*

— angustifolia.

— Annei *rosea*.

— bicolor de Java.

CANNA commutata.

— gigantea.

— indica major.

— lœta.

— leptochila.

— Mulleri.

— nepalensis.

— nervosa.

— Sellowi.

— variabilis.

— variegata.

La pièce . . . . » 75

Douze variétés . . . . 6 »

CASTANOSPERMUM australe 3 à 5 »

CASUARINA leptoclada . . . 2 »

— stricta. . . . . 2 »

— quadrivalvis . . . . . 2 »

CENTAUREA gymnocarpa . . 2 »

— ragusina . . . . 3 »

CERATOPETALUM gumniferum 3 à 15 »

CERATOSTEMA longiflora . . 2 »

CHAMÆBATIA foliosa. . . . 4 »

CHIRONIA floribunda . . . 2 »

— glutinosa. . . . . . . 2 »

CHOROZEMA Chandleri . . . 2 »

— speciosa . . . . 2 »

CINNAMOMUM sericeum . 2 à 4 »

— Maruba (brevifolium) . . 3 »

CITRUS californica . . . . 1 »

— grosso Bondoletto . . . 2 »

CLEMATIS lanuginosa . . . 2 »

— trifoliata . . . . 2 »

CLETHRA ferruginea . . . 2 »

CLIVIA nobilis . . . 5 à 10 »

CLUYTIA alternoïdes. . . . 3 »

COBOEA scandens *foliis albo var*. . . . . 1 »

COLLETIA cruciata (bictoniensis) . . . . . 2 à 4 »

CONVOLVULUS mauritanicus . » 50

CORDYLINE indivisa *vera*. 50 à 75 »

CORREA cardinalis . . . . 2 »

CUPHEA eminens. . . . . . » 50

— montana . . . . » 50

DAPHNIDIUM gracile. . . . 3 »

DASYLIRION sp. du Texas . . 15 »

DESFONTAINIA Hookeri (spinosa) 2 »

DIPLACUS Ingelrelsti . . . 1 »

— puniceo aurantiacus . . 1 »

DRACOENA australis . . 3 à 6 »

— Banksi . . . . 25 »

— congesta . . . . 2 à 4 »

— indivisa *Hortus* . . 20 à 40 »

— — (CORDYLINE) . . 50 à 75 »

DRACÆNA lineata	50	»
— luteo-lineata	30 à 50	»
— rigidifolia	3 à 6	»
— salicifolia	1	»
DRACOPHYLLUM gracile	10	»
DRIMYS chilensis	2	»
ECHEVERIA oberosa	1	»
ELOEOCARPUS Heyni, *fort*	15	»
ELODE ægyptiaca	2	»
EMBOTHRIUM coccineum	5	»
— lanceolatum	5	»
ENKIANTHUS longifolius	10	»
— macrophyllus	10	»
EPACRIS alba odorata	3	»
— carnea	3	»
— coruscans	3	»
— Eclipse	3	»
— grandiflora	3	»
— — *rubra*	3	»
— hyacintiflora	3	»
— impressa	3	»
— lævigata	3	»
— magnifica	3	»
— miniata	3	»
— — *splendens*	3	»
— pungens	3	»
— Tauntoniensis	3	»
EPIGYNIUM leucobotrys	30	»
ERICA ampullacea *major*	5	»
— — *rubra*	5	»
— — *scotica*	5	»
— arbuscula	3	»
— caffra	3	»
— candidissima	3	»
— Candolleana	5	»
— curviflora *lutea*	3	»
— Devoniana	5	»
— Hartnelli	5	»
— mammosa *pallida*	3	»
— metulæflora superba	5	»
— mollis	3	»
— Rubens	3	»
— Sindryana	3	»
— speciosa	4	»
— spenceriana	4	»
— tricolor *elegans*	5	»
— — *major*	5	»
— verticillata	4	»
— vestita *coccinea*	4	»
ERIOMYRTA virgata	2	»
ERIOSTEMON intermedia	3 à 6	»
— neriifolium	3 à 6	»
— Smithi	6	»
ERYTHRINA Cottiana	2	»
— crista-Galli, *fort*	3	»
ERYTHRINA Marie Belanger	4	»
— Ruberrina	4	»
EUGENIA americana	2 à 4	»
— myrtifolia	2	»
— Ugni, *très-bon fruit*	1 à 3	»
EURYA latifolia *variegata*	10	»
EURYBIA ferruginea	1	»
— tomentosa	1	»
FAGARA horrida	2	»
FAGUS Kubi	2	»
FARFUGIUM grande	1	»
FERDINANDA eminens	1	»
FICUS macrophylla	1	»

FUCHSIA variétés nouvelles (*voir p.* 5.)

— Ambassador (*Bull.*)
— Annie (*Hend.*)
— Bianca (*Rollis.*)
— Collen Bawn (*R.*)
— Comet (*Banks*) *extra*.
— Comte de Lannoy (*Cornel.*)
— Count Cavour (*Banks.*)
— Coronal (*Smith*)
— Directeur Cambier (*C.*)
— Duc d'Aremberg (*C.*)
— Eléonore Van Meldert (*C.*)
— Fascination (*Smith.*)
— F. de Tollenaert (*C.*)
— Figaro (*Small.*)
— Goliath (*Smith.*)
— Jos. Cornelissen (*C*)
— King of purple (*Smith.*)
— La Crinoline (*B.*)
— Lord Clyde (*Youell.*)
— — Ingestre.
— Mme Cornelissen (*C.*)
— — Lambert (*Lem.*)
— — Van Houtte (*L*)
— Mammoth (*Smith.*)
— Masterpièce (*Smith.*)
— Minnie Banks (*Banks.*)
— M. Braent (*C.*)
— Pioner (*Smith.*)
— Président (*Roll.*)
— — Muller (*C*)
— Prince Léopold (*H.*)
— Riflemann (Roll.)
— Rigolboche (*L.*)
— Robin Wood (*Roll.*)
— Secrétaire Mottin (*C.*)
— Sir C. Campbell (*Wh.*)
— Solférino (*Lem.*)
— Striata (*Smith.*)
— Venetia (*Roll.*)
— Victor Cornelissen (*C.*)
— White Lady (*H.*)

FUCHSIA Wilh Pfitzer (*Lem*)	
La pièce, au choix.	» 50
Douze variétés.	5 »
GARCINIA australis	2 à 4 »
GARDENIA floribunda	2 »
— Lowi	2 »
— radicans *fol. var.*	3 »
GARRYA macrophylla	2 »
GASTROLOBIUM Leakeanum	4 »
GAULTHERIA organensis	3 »
GAZANIA aurantiaca (*page* 6)	2 »
— souci (*page* 6)	2 »
— splendens	» 50
GOMPHOLOBIUM capitatum	5 »
— Lindleynum	5 »
GONOCALYX pulcher	2 »
GNAPHALIUM lanatum *plante excellente pour bordure.*	» 50
La douzaine.	3 »
GNIDIA pinifolia	2 à 4 »
GREVILLEA elegans (alpestris)	3 »
— flexuosa	3 »
— longifolia	2 à 4 »
— Maclayana	10 »
— punicea superba	7 »
— robusta	2 à 4 »
— spartioïdes	2 »
GRISELINA littoralis	1 »
— macrophylla	3 »
HAKEA pectinata	2 à 4 »
— pinifolia	2 à 4 »
— pinnatifida	2 à 4 »
— Victoria	2 à 4 »
HELYCHRYSUM Brucei	3 à 5 »
— macranthum purpureum	3 à 5 »
HOVEA pungens	5 »
ILLICIUM anisatum	3 »
— religiosum	3 »
INDIGOFERA purpurea	1 »
— Roylei	1 »
JOCHROMA Warscewiczi	1 »
KENNEDIA Baumanni	3 »
— Makoyana	2 »
— monophylla	2 »
— ovata *alba*	2 »
— — *rosea*	3 »
KNIGHTIA excelsa, *fort.*	7 à 15 »
LANTANA Étoile de Provence	1 »
— l'avenir	1 »
— rose d'amour	1 »
— souvenir de Pékin	1 »
— volcan	1 »
LARDIZABALA biternata	2 »
LAURELIA aromatica	2 »
LAURUS camphora	2 à 4 »
— graveolens	2 à 4 »
LEPTOSPERMUM recurvum	2 »
LEUCOPOGON floribundus (Richei)	5 »
LOMATIA anethifolia	15 »
— heterophylla	4 à 8 »
— ilicifolia	1 »
— silaïfolia	1 »
— — elegans	10 »
MAGNOLIA fuscata	3 »
MAHONIA Ehrenbergi	2 »
— nepalensis	3 à 6 »
MELALEUCA acrotrichoïdes	1 à 3 »
— gibbosa	1 »
MELICOPE simplicifolia	2 »
METROSIDEROS florida	2 »
— — *fol. eleg. var.*	4 »
— linearis	2 »
— robusta	1 »
MIMULUS OEsope	» 50
— carminata superba	» 50
— cupreus	1 »
— la fiancée	» 50
— Lycerus	» 50
— Psyché	» 50
MIMUSOPS trifoliata	2 »
MIOPORUM cristalinum	2 »
MIRBELIA floribunda	7 »
MUSCHIA Wollastoni	2 »
MYRRHINIUM purpureum	1 »
MYRTUS americana	1 à 3 »
— annularis	1 à 2 »
— apiculata	1 à 2 »
— bullata	1 »
— costaricensis	1 »
— Ugni, *de Veitch.*	1 à 3 »
OLEA ilicifolia	2 à 4 »
OXYLOBIUM Osborni	3 à 6 »
PACHYSANDRA terminalis *fol. var*	5 »
PANAX arboreum	2 à 4 »
— Shefferæ (ARALIA)	2 à 4 »
PASSIFLORA Impérce Eugénie	1 »
PELARGONIUM *à grandes fleurs et fantaisies; trente des meilleures variétés.*	
La pièce.	» 75
Douze variétés	6 »
PELARGONIUM ZONALE (GÉRANIUM) : *variétés nouvelles* (*voir page* 6).	
— beauté du parterre.	
— Baronne de Vrière.	
— Boule de neige.	
— Cte de Morni.	

PELARGONIUM ZONALE (GÉRANIUM) :
— Daniel Manin.
— Etoile de Magenta.
— Fatanitza.
— Francor. Restaurator.
— François Desbois.
— Impératrice Eugénie.
— le Zouave.
— Lucien Tisserand.
— Mme Lavocat.
— — Paquot.
— — Vaucher.
— Marie Drouard.
— Meteor.
— Minimum Nosegay.
— Penelope.
— Pink tom Tumb.
— Princesse Clotilde.
La pièce. . . » 50
Douze variétés. . 5 »
PELARGONIUM ZONALE *à feuilles panachées.*
— Burning Bush . . . . 5 »
— Cloth of Gold . . . . 2 »
— Golden Fleece . . . . 2 »
— — Harkaway . . . . 4 »
— mountain of Light . . . 1 »
— variegated nosegay. . . 2 »
PETUNIA *nouveaux (voir page 6)*
PERNETTIA ciliaris . . . . 4 »
— speciosa . . . . 3 »
PEUMUS Boldus (fragrans). . 3 »
PHÆNOCOMA prolifera Barnesi 3 à 6 »
PHILESIA buxifolia . . 4 à 8 »
PIMELEA elegans. . . . . 2 »
— Neippergiana. . . . . 3 »
PODALYRIA sericea . . . . 1 »
PODOLOBIUM heterophyllum . 5 »
— Hugeli. . . . . 5 »
— staurophyllum . . . . . 5 »
POLYSPORA axillaris . . . 2 »
— grandis . . . . 3 »
PROTEA cynaroïdes. . . . 3 »
— speciosa . . . . . 3 à 6 »
PULTENÆA stricta . . . . 1 »
PUNICA granatum Legrelli, *fortes plantes* . . 2 à 4 »
PRONAYA spectabilis. . . . 2 »

QUERCUS glabra . . . 2 à 4 »
RHAMNUS alaternus *fol. var.* 2 »
— chlorophora . . . . . 1 »
RHODOLEIA championi . 2 à 3 »
RUBUS australis . . . . . 2 »
SALVIA albo cœrulea . . . 1 »
— barbata . . . . 1 »
— diclytroïdes . . . . . 1 »
— obtusa. . . . . 1 »
— tricolor . . . . 1 »
SERISSA buxifolia . . . . 1 »
— — *flore pleno* . . . . 1 »
— fætida *fol. albo margin. (voir page 5)* . . . . 2 »
SISYRINCHIUM versicolor . . 10 »
STADMANNIA australis . 3 à 6 »
STATICE brassicæfolia. . . 5 »
— Halfordi . . . . 4 »
— Reinwardi . . . . . . 2 »
STENOCARPUS salignus. . . 1 »
STYPANDRA frutescens . . . 1 »
STYPHELIA juniperoïdes. 1 à 2 »
SWAINSONIA grandiflora alba. 1 »
TECOMA Latrobei. . . . . 1 »
THEA assamica . . . 1 à 3 »
— bohea . . . . . . 1 à 3 »
— camellioïdes . . . . . 1 »
— viridis . . . . . 1 à 3 »
THOMASIA prostrata. . . . 1 »
THYSANOTHUS proliferus . . 2 »
TRISTANIA neriifolia. . . . 2 »
VACCINIUM erythrinum. 2 à 4 »
— Imrayi. . . . . 8 »
— Sprengeli. . . . . . . 1 »
VERBENA *nouvelles (voir p. 7)*
VERONICA Andersoni *fol. var.* » 50
— Mme Boucharlat. . . . . » 50
— Pertuzesi. . . . . . » 50
— spatulata . . . . . . 1 »
WIGANDIA caracassana *énorme feuillage, plante pour pleine terre pendant l'été* 1 »
WITZENIA corymbosa . 3 à 6 »
XANTHOSIA rotundifolia . . 1 »
YUCCA alœfolia *fol. var.* 7 à 20 »
— — *purpurea* . . . . 4 »
— quadricolor . . . . . 20 »
ZIERIA macrophylla. . . . 2 »

CONIFÈRES.

ARAUCARIA Bidwelli . . . . 10 »
— — *très-fort.* . . . 200 »
— Cooki *de graine.* . 15 à 40 »

ARAUCARIA Cunninghami . . 10 »
— — *très fort.* . . . 100 »
— excelsa . . . . . 10 à 20 »

ARAUCARIA glauca . . 10 à 20 »
— — multiceps . . . . . 10 »
— glacilis, *tête greffée* 10 à 20 »
— imbricata *de graine* 2 à 40 »
— — *très-fort* . . . . 150 »
ARTHROTAXIS Gunneana 7 à 15 »
CEPHALOTAXUS montana 5 à 6 »
CHAMOECYPARIS glauca . . . 2 »
— thurifera . . . . 3 »
CUPRESSUS caschmirensis candicans . . . . 2 »
— goveniana . . . 2 à 4 »
— Lindleyana . . . 2 à 4 »
DACRYDIUM elatum . . 5 à 40 »
— Franklini . . . . . 2 à 6 »
— glaucescens . . . 5 à 6 »
DAMMARA australis . . 7 à 15 »
— Browni . . . . 15 »
— orientalis. . . . . . 10 »
— — alba . . . . 10 »
— — *extra fort, six mètres de hauteur* . . . . 400 »
FRENELIA crassivalvis . . . 5 »
— Odenatis . . . . 4 »
PINUS palustris (australis) 5 à 6 »
PODOCARPUS acicularis. 1 à 5 »
— antarctica . . . 4 à 8 »
— Blumei (latifolia) . 5 à 10 »
— cupressinoïdes (Horsfieldi) 15 »
— japonica . . . . . 2 à 4 »
— — *fol. var* . . . 4 à 8 »
— lanceolata (Thumbergi) 2 à 4 »
— Purdieana. . . . . 2 à 4 »
— Salicifolia. . . . 5 à 6 »
— zamiœfolia *vera* . . . 10 »
RETINOSPORA ericoïdes. 1 à 2 »
— Lycopodioïdes . . . . . 25 »
— obtusa. . . . . . 5 à 10 »
— pisifera. . . . . . 3 à 10 »
TORREYA Humboldti. . 5 à 10 »
— Myristica . . . . 5 »
WIDDRINGTONIA juniperoïdes 1 à 5 »

RHODODENDROM.

Acutilobum. . . . . 2 »
Aeruginosum. . . . 2 à 4 »
Arboreum. . . . . 5 à 6 »
Argenteum . . . . 4 à 8 »
Aucklandi (Griffithi) . 5 à 6 »
Barbatum. . . . . 5 à 6 »
Blumeï . . . . 8 »
Calophyllum . . . . 4 à 10 »
Camelliœflorum. . . . . . 5 »
Campylocarpum. . . 2 à 6 »
Ciliatum . . . . . . 1 à 5 »
— *fol. aurea margin*. . . 2 »
Crispiflorum. . . . . . . 2 »
Dalhousiæ . . . . 2 »
Edgeworthi. . . . . 2 à 5 »
Floribundum. . . . 2 à 4 »
Hookeri. . . . . 4 »
Jenkinsi . . . . . . 4 à 10 »
Lancifolium . . . . . 2 à 4 »
Maddeni . . . . . . 4 à 8 »
Nuttalli. . . . . . . 4 à 8 »
Retusum . . . . . . 4 à 15 »
Roylei. . . . . . . 2 à 4 »
Tubiflorum . . . . . 5 à 6 »
Veitchi. . . . . 5 »
Virgatum. . . . . . 2 à 4 »
Wighti. . . . . . . 2 à 4 »
Windsori . . . . . . 2 à 4 »
— leucanthum . . . . 2 à 4 »

PALMIERS ET CYCADÉES.

CHAMOEROPS arborescens 10 à 40 »
— argentea, *très-fort* . 500 »
— excelsa (chinensis). 20 à 50 »
— humilis . . . . . 2 à 40 »
— histrix, *très-fort* . . 500 »
— palmetto . . . . . 2 à 40 »
CYCAS revoluta . . . . 5 à 20 »
— — *très-fort*. . . . 500 »
DIOON edule . . . . . 10 à 40 »
JUBÆA spectabilis (Cocos chinensis) . . . . 15 »
LIVISTONIA australis (CORYPHA) . . . . . . 8 à 20 »
— — *extra fort* . 500 à 1000 »
RHAPIS Sierotsik. . . 10 à 50 »
SABAL Adansoni. . . . 7 à 50 »
— mexicana. . . . . 10 à 60 »
SEAFORTIA elegans . . 20 à 100 »
— — *extra fort* . . . 800 »

PLEINE TERRE.

PLANTES VIVACES

Disponibles en pots.

Acantholimon glumaceum	1	»
Achillea clavennæ	»	50
Adenophora lactiflora *alba*	1	»
— — *cœrulea*	1	»
Æra cœrulea *varieg.*	»	50
Ajuga marmorata	»	25
Alyssum saxatile *fol. var.*	1	»
Anemone hybrida	»	50
— japonica	»	50
— — *Honorine Jobert (voir page 8)*	4	»
Amaryllis Belladona *rosea perfecta*	2	»
Aquilegia formosa *fol var.*	2	»
— Witmanniana	1	»
Arondo donax *versicolor*	1	50
Asphodelus luteo-pleno	»	50
— ramosus albus	»	50
Aster coccineus	1	»
— humifusus	»	50
Bambusa arondinaria	»	50
— Metake	»	50
Calystegia pubescens	»	50
Campanula coronata *cœrulea*	»	50
— grandiflora *alba*	1	»
— — *cœrulea pleno*	1	»
— pyramidalis	»	50
Carex jap. *fol. varieg.*	»	50
Cerastium tomentosum	»	50
Chelone magnifica	»	50
Chrysanthemum sinense (*variétés précoces*) *La pièce*	»	50
Douze variétés	5	»
Convolvulus Althœïfolia	»	50
— soldanella	»	50
Delphinium formosum	»	50
— Guillaume Tell	2	»
— Mme Florence Grisau	2	»
— — Guichard (*v. page* 8)	5	»
— M. Barthère	2	»
— ranonculæflorum	1	»
Dianthus altaïcus	»	50
— Beauty of Day	»	75
— Maulei	»	50
— plumaris	»	50
— tigrinus	»	50
Diclytra spectabilis	»	50
Echinops Ruthenica	»	50
Elymus arenaricus	»	50
Epimedium niveum	1	»
Erianthus Ravennæ	»	50
Erodium pelargoniœflorum	»	75
Erysimum barbarea *fol. var.*	»	50
Farfugium grande	»	75
Festuca glauca (*pour bordures*)	»	25
— variabilis (*id.*)	»	25
Funkia aurea varieg.	1	»
— japonica *fol. luteo viridis*	»	50
— lanceolata *fol. marg.*	»	50
Gaillardia grandiflora	»	50
— Joseph Esser (*très-joli*)	1	»
— Loiseli (*voir page* 8)	5	»
Geum coccinum pleno	»	50
Gynerium argenteum	»	75
Helleborus. abschaticus	2	»
— atrorubens	2	»
— niger	»	50
Hemerocallis disticha	1	»
— elegantissima *de Hong-Kong*	5	»
— fulva *fl. pleno*	1	»
— gigantea	7	»
— Kwanso *fl. pl. fol. var. rien de plus beau et de plus remarquable que cette plante; panachure des plus riches; fleurs doubles, extrêmement grandes*	10	»
Hypericum Ascyron	»	50
— balearicum	1	»
Ipomæa candicans	»	50

IPOMÆA dahurica . . . . » 50
— inflata. . . . . » 50
JEFFERSONIA diphylla 1 50
JUNCUS conglomerata *fol. lutteo vittatis*. . . . . 2 »
LATHYRUS biflorus . . . . » 50
LIATRIS scariosa. . . . . » 50
LILIUM giganteum. *fort* . . 20 »
— lancœfolium *album* . . 1 »
— — *rubrum* . . . . . 1 «
LOBELIA, 15 *variétés, la pièce* » 50
La douzaine. 5 »
LYCHNIS Haageana (Sieboldi). 1 »
MIMULUS cupreus, *jolie nouveauté à fleur orange cuivré* 1 »
MONARDA coccinea *bella* . . » 50
NORDMANNIA cordifolia. . . » 50
OPHIOPOGON jaburan *fol. var.* 10 »
OROBUS azureus . . . . . » 50
PENTSTEMON *nouveaux* (*V. p.* 8)
— Duc de Lorraine. . . . » 75
— Jeanne d'Arc. . . . . » 75
— Jules Thierry . . . . » 75
— Léonie Vainclair . . . » 75
PHLOX DECUSSATA, 25 *belles variétés à* 0.50 *pièce; douze variétés*. . . . 5 »
PHYGELIUS capensis. . . . » 50
PITHYROSPERMA acerifolia. . 1 »
PLUMBAGO larpentæ. . . . » 50
POLEMONIUM cœruleum *fol.var* 2 »
POTENTILLA aurora pleno . . 1 50
— coccinea plena 1 50
— formosissima . . . . 1 »
— Guascoï . . . . 1 »
— Mulleri . . . . » 75
— — *fl. pl.* . . . . . . 1 »
— perfecta plena 1 50
— purpureo luteo-plena . . 1 50
— purpurea plena 1 50
— splendidissima . . . . 1 »
— variabilis plena. . . . 1 50
— versicolor plena . . . 1 50
PRIMULA acaulis lilacina pleno » 50
— — marginata pleno . . » 50
— — multicolor nigra . . » 50
— — sulphurea plena. . . » 50
PULMONARIA sibirica . . . 1 »
PYRETHRUM bouquet rose . . 1 »
— Tom-Pouce . . . . . . » 75
— V. Lemoine . . . . . 1 »
RANONCULUS aconitifolius *fl. pl.* 1 »
ROSES TRÉMIÈRES. — ALCEA ROSEA PL.
— Acteon . . . . 2 »

ROSES TRÉMIÈRES. — ALCIA ROSEA PL.
— Attraction . . . . . 1 »
— Avocat Mottin . . . . 1 »
— Baron F. de Sélys . . . 1 »
— Candidissima . . . . 1 »
— Duke of Wellington . . 1 »
— Edouard Morren . . . 2 »
— Géant des batailles . . 1 »
— Illuminator . . . . . 2 »
— Ingénieur Bodson . . . 1 »
— Jules Pirlot . . . . . 2 »
— King of Oude . . . . 2 »
— Lagoa d'Amore . . . . 1 »
— Loveliness . . . . . 1 »
— M Roake. . . . . . . 2 »
— Olhos d'Agoa . . . . 1 »
— Président Lambinon . . 2 »
— Purple perfection . . . 2 »
— Regina . . . . 2 »
— Rembrandt . . . . . 1 »
— Splendens . . . . . 2 »
SCROPHULARIA officinalis *fol. var* . . . . » 75
SCUTELLARIA macrantha . . 1 »
SEDUM carneum *fol. var.* . . » 50
— fabarium . . . . . . 1 »
— macrophyllum . . . . 1 »
— Sieboldi . . . . . . » 50
— — *foliis medio pictus* (*voir page* 9). . . . . . 8 »
SPERGULA pilifera . . . . » 50
STOKESIA cyanea; *plante très-jolie, fleur très-grande bleu de ciel, ressemblant pour la forme au bluet des champs, qu'elle surpasse en grandeur* . . 1 »
SYMPHITUM officinale *fol var* 2 »
THALICTRUM anemonoïdes fl. pl. 1 »
THYMUS serpyllum . . . . » 50
TRITOMA Burchelli . . . . 1 »
— — *fol. var.* . . . . 3 »
— pumila . . . . 1 »
— Rooperi . . . . 2 »
— Uvaria . . . . 2 »
VERONICA Gentianoïdes *fol. var.* . . . . 2 »
— glabra *fol var.* . . . » 50
VINCA major *fol. var.* . . . » 50
YUCCA arcuata . . . 3 à 15 »
— concava . . . . . 4 à 10 »
— glaucescens . . . 3 à 20 »
— gloriosa . . . . . 4 à 20 »
— plicata. . . . . . 7 à 25 »
— umbraculifera . . 7 à 25 »

ARBRES ET ARBUSTES RUSTIQUES

Disponibles en pots.

ACER negondo *fol. arg. var.* 1 à 2 »
AESCULUS Hipp. *laciniatus*. . 2 »
AKEBIA quinata . . . . . . 1 »
ALNUS imperialis *asplenifolia*. 1 à 2 »
AMYGDALUS pumila *fl. albo pleno*. . . . . . . 1 »
ARMENIACA vulgaris *fol. aureo macul*. 1 50
AUCUBA himalayca (*voir p.* 9). 5 »
— japonica viridis fœmina (*voir page* 9). 6 »
BERBERIS concinna. . . . 5 »
— Darwinii . . . . 1 »
— dealbata . . . . 5 »
— empetrifolia . . . 1 à 2 »
— Fortuneana . . . . . . 1 »
— Hookeri . . . . 1 à 2 »
— microphylla serratifolia . 1 50
— Neuberti . . . . 1 »
— vulgaris *foliis purpureis* . » 50
— Wagneri *magnifique* . . 4 »
BETULA tristis ; *haute tige* . 1 50
BIGNONIA capreolata. . . . 1 »
BUXUS longifolia. . . . . 1 »
— rotundifolia . . . . . . 1 »
CALLICARPA japonica . . . » 50
CARAGANA microphylla . . . 1 »
— jubata . . . . 2 »
CEANOTUS Arnoldi (*v. p.* 9) . 4 »
— grandiflorus *roseus*. . . 1 »
CERASUS de la Chine *rose double* 1 »
— Mahalep *fol var*. . . . 5 »
— Vulgaris *fol. var*. . . . 1 »
CLEMATIS francofurtensis . . 1 »
— Guascoi . . . . 1 »
— lanuginosa . . . . . . 2 »
COTONEASTER buxifolia. . . 1 »
— microphylla . . . . . . 1 »
— rotundifolia . . . . . . 1 »
— Simondsi . . . . 1 »
— Thymifolia . . . . . . 1 »
CRATÆGUS oxyac. *fol albo.var*. 1 »
— pyracantha japonica . . 1 »
CYDONIA japonica Gaujardi 1 à 5 »
— — Mallardii . . . . . 2 »
— — Papeleui . . . . . 2 »
— — Princesse Emilie Soutzo 2 »
— — princeps . . . . . . 2 »
CYTISSUS atropurpureus . . » 75
— filipes . . . . 1 »
— purpureus. . . . . . . » 75
— — *fl. albo* . . . . . . 1 »
DEUTZIA gracilis *fol. var*. (*voir page* 10). . . . 10 »
EDWORTHIA chrysantha. . . 1 »
ELEAGNUS reflexa. . . . . » 50
— — *fol. var*. . . . . . . 1 »
EVONYMUS jap. *fol. albo striatis* (*voir page* 10). . . 5 »
— — *fol. albo marginatis*. » 75
— — *fol. aureo varieg*. . » 75
— — *ovalis fol. aureo var*. (*voir page* 10) . . . 5 »
— — *tricolor* (*voir p.* 10). 5 »
— pulchellus . . . . . . 1 »
— radicans *fol. albo marg*. (*voir page* 10). . . . 4 »
— — *fol. roseo marg*. (*voir page* 10) . . . . . 2 »
FAGUS kubi . . . . 1 »
FORSYTHIA suspensa . . . » 50
— viridissima . . . . . . » 50
Fraxinus californica . . . 1 »
— excelsior aucubæfolia . . 1 »
— — *fol. albo varieg*. . . 1 »
— — spectabilis . . . . 8 »
— oxyacanthifolia 1 50
— serratifolia 1 50
GLYCINE chinensis . 0,50 à 1 »
— — *fl. albo* . . . . . 1 »
— frutescens magnifica . . 1 »
HEDERA algeriensis. . . . » 50
— Helix *fol. arg. var*. . . » 50
— — *maculata*. . . . . » 50
— hibernica *fol. eleg var*. . » 50
— latifolia maculata. *très-joli* » 50
— macrophylla . . . . . . » 50
— Rhombea *fol var*. . . 2 »
HYDRANGEA chinensis . . . » 50
— cyanea. . . . . 5 »
— japonica *fol argenteo var*. 0,50 à 1 »
— — *fl. albo* . . . . . 5 »
— — *fl. roseo* . . . . . 5 »
— nivea . . . . » 50
— pubescens . . . . . . » 50
— Roué . . . . » 50

HYDRANGEA tomentosa . . . » 50
ILEX Aquifolium (Houx panaches).
Plusieurs variétés, la pièce. 2 »
— cornuta . . . . 1 à 3 »
— Cunninghami 1 50
— Fortunei . . . . 1 à 3 »
— furcata . . . . 1 à 3 »
— latifolia . . . . 1 à 3 »
— latispina . . . . . . 2 »
— leptacantha . . . . . 2 »
— microcarpa . . . . 1 à 3 »
— nobilis . . . . . . 3 »
— Tarajo. . . . . 2 à 4 »
JUGLANS regia laciniata. 3 à 6 »
KERRIA japonica *fol. arg. var.* (*voir page* 10). . 3 à 6 »
— — ramula (*Siebold*) . . » 50
LONICERA brachypoda *fol. aureo reticulatis* (*v. p.* 10) 3 à 6 »
— splendida. . . . . . » 75
MAGNOLIA gigantea. . . . 3 »
— glauca *Thompsoniana*. . 3 »
— grandiflora . . . 2 à 10 »
— — exoniensis . . 4 à 10 »
— macrophylla . . . 3 à 6 »
MAHONIA (BERBERIS) anemonifolia . . . . . 3 à 6 »
— aquif. *heteroph. varieg* . 8 »
— Beali . . . . . 1 à 6 »
— Fortuneana . . . . . 1 »
— japonica . . . . 1 à 8 »
— pallida . . . . 3 à 5 »
NANDINA domestica. . . . 2 »
NATHALIA cerasiformis. . . 1 »
OLEA ilicifolia . . . 2 à 4 »
POEONIA Moutan comata . . 3 »
— — Comte de Flandre 2 à 4 »
— — Delachei . . . 2 à 5 »
— — Edwarsii. . . 3 à 6 »
— — Emile Frésart, *fleur très grande et bien pleine, carnée ; extra.* . 20 à 40 »
— — germanica . . . . 3 »
— — Georges Rollisson, *fleur très-double, rose carminé, le pourtour blanc carné.* . . 15 à 25 »
— — lactea. . . . 3 à 6 »
— — Lambertinæ *Nobis* 8 à 20 »
— — Président Lambinon, *fleur large et très-double rose amaranthe très-pur, pétales entiers et arrondis* . . . 10 à 20 »

POEONIA Moutan Professeur Morren, *fleur d'une ampleur extraordinaire couleur clair vif, strié de mauve au fond.* . 10 à 20 »
— — rosea purpurea. 2 à 4 »
— — Triomphe de Malines. . . . . 3 à 6 »
— — Victoria . . . 2 à 4 »
— papaveracea fimbriata carnea pl. . . . . 3 à 5 »
— — Hookerii . . . 6 à 12 »
— rubra Mme Stuard Low, *surpasse de beaucoup Elisabethæ*. . . 10 à 25 »
— — plenissima . . 3 à 6 »
— — Rosa Mundi. . 5 à 10 »
PASSIFLORA Colvilli. . . . » 75
PAVIA californica . . . . 2 »
PHELLODENDRON amurense. . 5 »
PHOTINIA serrata. . . . . 1 »
PRUNUS sinensis *albo pleno*. 1 »
— triloba . . . . . . 2 »
QUERCUS agrifolia . . . . 2 »
— atrosanguinea . . . . 3 »
— cerris *fol. var.* . . . 2 »
— heterophylla . . . . . 2 »
— laurifolia . . . . . . 2 »
— macrocarpa . . . 1 à 3 »
— pendunc. filicifolia. . . 2 »
— — pectinata. . . 1 à 2 »
ROBINIA inermis *fol. arg. var.* 1 50
— pseudacacia *fol aureo var.* 1 50
RUBUS rotundifolius. . . . 1 »
SKIMMIA japonica . . 1 à 2 »
SORBUS nana (siberica) . . 1 »
SPIRÆA californica. . . . » 50
— callosa *alba, très-joli* . 1 50
— cuneata . . . . . . » 50
— Fortuneana (callosa) . . » 50
— Hookeri . . . . . . » 50
— pachystachys . . . . » 50
— prunifolia *fl. pl.* . . . » 50
— Regelii Nobleana . . . » 50
— Thumbergi . . . . . 1 »
SYMPLOCOS japonica. . . . 1 »
TILIA argentea . . » 75 à 1 50
— — *pendula* . . » 75 à 1 50
— europea . . . » 75 à 1 50
— parvifolia *fol. var.* . . 6 »
VIBURNUM dilatatum. . . . 1 »
— macrocephalum . . 1 à 3 »
— plicatile . . . . 1 à 3 »
WEIGELIA amabilis . . . . » 50
— — *fol. var.* . . . . . . » 50

WEIGELIA amabilis Grœnewegeni » 50
— — Isoline. . . 0,50 à 1 »
— — striata. . . 0,50 à 1 »
— — Van Houttei. 0,50 à 1 »
WEIGELIA rosea Desboisi 0,50 à 1 »
— — nana *fol. var.* 0,50 à 1 »
— — Stelzneri . . 0,50 à 1 »

CONIFÈRES RUSTIQUES.

ABIES canadensis . . 2 à 10 »
— cilicica. . . . . 3 à 6 »
— crassifolia . . . . . . 8 »
— Douglasi . . . . 3 »
— eremita . . . . . 3 à 6 »
— excelsa pyramidalis . . 4 »
— Khutrow (Smithiana) 3 à 10 »
— Mertensis. . . . 2 à 4 »
— Nordmanniana . . 7 à 12 »
— orientalis . . . 3 à 12 »
ARAUCARIA imbricata . 2 à 40 »
— — *très-fort* . . . . . 150 »
ARTHROTAXS cupressiformis . 3 »
BIOTA orientalis elegantissima 10 »
— prostrata. . . . . . . 7 »
— recurva . . . . 4 à 12 »
CALLITRIS Quarii. . . 1 à 3 »
CEPHALOTAXUS adpressa 2 à 10 »
— Fortuneï *fœmina*. . 2 à 4 »
— — *mascula* . . . 2 à 4 »
— Koraïensis (PODOCARPUS coreana). . . . . 2 à 6 »
— pedunculata (PODOCARPUS Harringtoni). . . 2 à 5 »
CHAMÆCYPARIS thurifera 2 à 4 »
CRYPTOMERIA japonica 0,50 à 3 »
— — araucarioïdes . . 2 à 4 »
— — *fol. arg var.* . . . . 3 »
— — Lobbi . . . 0,50 à 3 »
CUPRESSUS funebris . . 1 à 2 »
— goveniana. . . . 1 à 2 »
— Lawsoniana . . . 1 à 7 »
— Lindleyana . . . 2 à 4 »
— religiosa . . . . 2 »
FITZ-ROYA patagonica . 1 à 3 »
FRENELLA crassivalvis . . . 3 »
— Odenata . . . . 4 »
JUNIPERUS aromatica . . . 3 »
— bermudiana . . . 2 à 10 »
— communis hibernica. 1 à 3 »
— — compressa . . . . 3 »
— diœcia. . . . . 2 »
— excelsa . . . . . 2 à 4 »
— — *glauca* . . . 3 à 6 »
— flaccida . . . . 1 à 3 »
— fragrans . . . . . 2 à 4 »
— gossainthanea . . . . 2 »
JUNIPERUS japonica . . 1 à 3 »
— macrocarpa . . . 2 à 5 »
— Oxyc. echiniformis. 2 à 5 »
— phœnicea . . . . 2 à 6 »
— prostrata . . . . 1 à 3 »
— recurva . . . . . 2 à 4 »
— religiosa . . . . . 2 à 6 »
— Sabina. . . . . . 1 à 3 »
— — fol. var. 1 50
— — Scholli . . . 2 à 5 »
— — tamariscifolia 0,50 à 1 »
— sphærica . . . . . 2 à 5 »
— squamata (dumosa) . . 2 »
— tripartita . . . . . 3 à 5 »
— virg. Cannaerti . . 2 à 6 »
— — Bedfordiana . . . . 2 »
LIBOCEDRUS chilensis (THUJA). 2 à 5 »
PICEA amabilis . . . 5 à 10 »
— balsamea prostrata. . . 5 »
— grandis . . . . 5 à 10 »
— nobilis. . . . . 4 »
— pichta (sibirica) (dumosa). 5 à 15 »
— pinsapo . . . . 1 à 20 »
PINUS Bujoti . . . . 5 »
— Mandchuri ; *très joli* . . 15 »
— palustris . . . . 2 à 4 »
— Sabiniana. . . . . 5 à 10 »
— Strobus excelsa himalayensis . . . . 2 »
PODOCARPUS andina . . 2 à 5 »
— canalicula (coreana) 2 à 5 »
— japonica (longifolia) 2 à 4 »
— — *fol. var.* . . . . 3 à 6 »
— Nubigena . . . . . 4 à 8 »
RETINOSPORA ericoïdes (WIDDRINGTONIA) . . 1 à 2 »
— obtusa . . . . . 3 à 10 »
— Pisifera . . . . . 5 à 10 »
SALISBURIA adiantifolia. 2 à 10 »
— — *incisa*. . . . . 2 à 5 »
— — *macrophylla laciniata*. . . . . 2 à 5 »
— — *pendula* . . . . . 10 »
SAXE-GOTHÆA conspicua 1 à 3 »
— gracilis . . . . . 1 à 3 »

SEQUOIA glauca	2 à 5 »
— sempervirens.	1 à 5 »
TAXUS adpressa	2 à 5 »
— baccata	0,75 à 3 »
— — ericoïdes	2 à 4 »
— — *fol aureo varieg.*	2 à 5 »
— — procumbens (stricta)	2 »
— fastigiata (hibernica)	2 à 6 »
— — *fol. varieg.*	2 »
— impérialis	2 à 4 »
— recurvata	2 à 4 »
THUJA caucasica	2 à 4 »
— d'Orient	0,50 à 2 »
— elegans	4 à 8 »
— ericoïdes, *très-joli.*	1 à 10 »
— falcata	4 à 10 »
— frenelioïdes	2 à 4 »

THUJA gigantea	1 à 5 »
— — *glauca.*	1 à 5 »
— Lobbii	2 à 5 »
— meldensis	1 à 2 »
— monstrosa.	3 à 6 »
— nepalensis	1 à 10 »
— occid. *fol. aureo var.*	2 »
— orient. *compacta*	1 à 20 »
— — *fol. aureo varieg.*	2 »
— pygmea	5 à 15 »
— recurvata	4 à 12 »
— tartarica	1 à 4 »
— — *minor.*	2 à 5 »
— Vervæneana	2 à 4 »
TORREYA grandis.	7 »
— Myristica	3 à 7 »
WELLINGTONIA gigantea.	2 à 15 »

ARBUSTES DE TERRE DE BRUYÈRE.

ANDROMEDA augusta.	1 50
— axillaris	1 »
— calyculata.	1 »
— — *angustifolia.*	1 »
— floribunda.	3 à 10 »
— formosa	2 »
— pulverulenta	1 »
ANTHYLLIS erinacea.	2 »
ARBUTUS Andrachne *rotundifolius.*	3 »
— californica.	3 »
— Rollissoni.	3 »
— Unedo *rubra.*	3 »
— — *myrtifolia*	3 »
AZALEA amæna de la Chine	1 à 2 »
CALYCANTHUS floridus	1 »
— occidentalis (macrophyllus)	1 à 2 »
— precox	1 »
CLETHRA alnifolia	0,50 à 1 »
— paniculata	0,50 à 1 »
DAPHNE Cneorum *fol. aureo marg.*	2 »
— mezereum.	» 25
— Van Houttei *fol. atropurpureis*	2 »
EMPETRUM rubrum	1 »
KALMIA augustifolia.	1 »
— — *media.*	1 »
— — *pumila rubra*	1 »
— glauca *superba.*	1 »
— lucida	1 »
LEDUM latifolium.	1 »
— palustre	0,50 à 1 »

PHILESIA buxifolia	4 à 8 »
RHODODENDRON alpinum.	2 à 4 »
— arboreum *Makoyanum.*	3 à 5 »
— Azaleoïdes *Cartoni.*	1,50 à 3 »
— — *Gowenianum.*	1,50 à 3 »
— californicum *Veitch.*	3 à 6 »
— campanulatum	2 à 10 »
— — *macranthum.*	3 à 15 »
— Catawbiense *elegantissimum*	2 à 4 »
— — hybridum	1 à 3 »
— *fastuosum pl.*	3 »
— — *Towardii.*	3 »
— ciliatum *precox superbum*	2 à 4 »
— Clowesianum.	3 »
— dauricum atrovirens	1 à 2 »
— hybridum	2 à 4 »
— Mme Wagner	2 à 5 »
— ponticum *album.*	2 »
— — — *multimaculatum*	2 »
— — *caucasicum*	3 à 10 »
— — — *très-fort*	30 »
— — *Clethræfolium varieg.*	3 »
— — *flos pictus* Cunningham	2 »
— — *fol albo marg.* (nazarethinum).	2 »
— — *fol aureo vareg.*	2 »
— — *Lowi*	2 »
— Prince Camille de Rohan.	2 »
— Roylei	3 à 6 »
— Verschaffelti	5 à 15 »
— Wallichianum.	2 à 4 »
— Witzoni	2 »

ROSIERS

Disponibles en pots.

Les variétés nouvelles sont marquées d'un astérisque (*).

		Haute tige.	Basse tige.	Franc de pied.
95	BANKSIANA hybrida rubra.	» »	1 »	» »
	BENGALES.			
400	A CINQ COULEURS ou de la Chine.	» »	1 »	» »
401	LOUIS PHILIPPE.	» »	» »	» 75
402	MARJOLIN, moyenne	» »	» »	» 60
	HYBRIDES REMONTANTS.			
142	* ADOLPHE NOBLET, fleur grande bien faite légèrement bombée, rouge clair brillant.	1 75	» »	1 25
141	* ALEXANDRE DUMAS, vig. fl. gr. bien faite cramoisi velouté noir strié de ponceau.	1 75	» »	» »
202	ALEXANDRINE BACHMETEFF.	1 50	1 25	» »
143	* ALPHONSE DAMAIZIN fl. moy. pl. bien faite rouge écarlate très-vif.	1 75	» »	1 25
187	ALTESSE IMPÉRIALE.	1 50	1 25	» »
144	* ARCHEVÊQUE DE PARIS, moy. pl., belle forme, pourpre velouté.	1 75	» »	1 25
199	ARDOISÉ DE LYON.	1 50	» »	» »
191	ARTHUR DE SANSAL.	1 50	» »	» »
11	AVOCAT MOTTIN.	1 25	» »	» 75
66	CARDINAL PATRUZZI	1 25	1 »	» 75
21	CAROLINE DE SANSAL.	1 25	» »	» »
205	CÉRÈS.	» »	1 »	» »
145	* CHARLES LEFEBVRE, fl. gr. pl. bien faite, beau rose vif à centre ombré pourpre.	1 75	» »	» »
146	* CHRISTIAN PUTTNER, fl. gr. pl. légèrement bombée, rouge pourpre vif et cramoisi foncé	1 75	» »	1 25
192	COMTE DE NANTEUIL.	1 25	» »	» »
147	* COMTESSE DE SEGUIER, fl. gr. pleine globuleuse, rouge velouté nuancé de violet.	1 75	» »	» »
148	* DUC DE ROHAN, fl. gr. très-pl. globuleuse, rouge vif nuancé de vermillon et de ponceau très-vif.	1 75	1 50	» »
40	DUC D'ORLÉANS.	» »	1 »	» »
203	DUCHESSE DE CAMBACERES.	1 25	1 »	» »
189	— D'ORLÉANS	1 25	» »	» »
39	ELISA MASSON	» »	1 »	» »
26	EMPEREUR NAPOLÉON.	» »	» »	» 75
193	FRANÇOIS ARAGO, moy. pl. amaranthe velouté, nuancé de plus foncé.	1 25	» »	» »
150	* — LACHARME, fl. grande carmin vif passant au rouge.	1 75	» »	1 25

		H. tige.	B. tige.	F. de pied
45	Géant des batailles.	1 25	1 »	» »
5	Général Jacqueminot.	1 25	1 »	» 75
38	Gerbe de Roses	1 25	» »	» »
151	* Gloire de Chatillon, fl. tr. pl. et très-gr. rouge éblouissant nuancé violet. . .	1 75	» »	1 25
29	Impératrice Eugénie.	» »	» »	» 75
152	* Jean-Baptiste Guillot, fl. moy. tr. pl. globuleuse, beau violet évêque nuancé rouge pourpre.	1 75	1 50	1 25
65	Lafontaine	1 25	» »	» »
153	* La brillante, fl. moy. pr. pleine; carmin rose transparent.	1 75	» »	1 25
154	* L'éblouissante, fl. très-gr. pl., belle forme, rouge clair ébouissant	1 75	» »	» »
37	L'enfant du Mont Carmel	» »	1 »	» »
25	Le lion des Combats	1 25	1 »	» »
12	Lord Raglan	1 25	» »	» »
178	Louise de Savoie	1 25	» »	» »
10	Louis Gullino	1 25	» »	» »
204	Mme Andri	1 25	» »	» »
155	* — Boutin, fl. gr. pl. bien faite beau rose	1 75	» »	1 25
156	* — Ch. Wood, tr. gr. tr. pl. beau rouge éblouissant passant au rose foncé vif, revers des petales blanchâtre. . . .	1 75	1 50	1 25
157	* — Clémence Joigneaux, fl. tr. en coupe, rouge vif éclatant	1 75	» »	» »
19	— Dommage.	1 75	» »	» 75
96	— Furtado, fl. tr. pl. très-large d'un beau rose plus vif et plus brillant au centre.	1 50	1 25	» »
78	— Heraud	1 25	» »	» »
158	* — Julie Daran, fl. tr. gr. pl. rouge vermillon satiné éclatant	1 75	» »	1 25
4	— Masson	» »	» »	» 75
51	Maréchal de la Brunerie	» »	» »	» 75
159	* — Vaillant, fl. gr. pl. bien faite beau rouge pourpre vif revers des pétales satiné plus clair.	1 75	» »	1 25
99	Maria Velaers.	1 25	» »	» »
161	* Monte Christo, fl. gr. pl. forme rouge cramoisi éblouissant, illuminé feu . .	1 75	» »	» »
162	* Notre-Dame de Fourvière, fl. gr. pl. rose tendre satiné	1 75	» »	» »
60	Nouvel étendart du grand homme. . . .	1 25	» »	» 75
163	* Olivier Delhomme, fl. moy. pl. r. vif brill.	1 75	» »	1 25
188	Poeonia	1 25	» »	» »
172	* Souvenir du Comte Cavour, fl. gr. pl. bien faite, rouge cramoisi velouté vif. . .	1 75	» »	1 25
173	* Triomphe de Caen, fl. gr. pr. pl. globuleuse, rouge velouté foncé, nuancé feu très-vif.	1 75	» »	1 25
184	Triomphe de l'exposition.	1 25	» »	» »
67	— des beaux-arts	1 25	» »	» 75
174	* Turenne, fl. moy. pl. à pétales larges et gaufrés, beau rouge éblouissant. . .	1 75	» »	1 25
17	Victor Verdier	» »	1 »	» »

		H. tige.	B. tige.	F. de pied
176	* VICOMTESSE DE MONTESQUIOU, fl. moy. presque pleine, rose tendre nuancé de saumon passant au blanc carné	1 75	» »	1 25
175	* VICOMTE VIGIER, fl. gr. pl. rouge violacé vif	» »	» »	1 25
177	VULCAIN	1 25	» »	» 75
186	WILLIAM GRIFFITH.	1 25	» »	» »
	ILES-BOURBON.			
20	BARON J. B. GONELLA.	1 25	» »	» »
133	CAROLINE RIGUET	1 25	» »	» »
136	DUCHESSE DE THURINGE	» »	» »	» 75
64	GLOIRE DE DIJON	1 25	1 »	» 75
128	LA REINE DES ILES BOURBON.	1 25	» »	» »
122	* MADEMOISELLE EMIN, moy. pl. blanche à centre rosé	1 75	» »	» »
123	* — FÉL'CITÉ TRUILLOT, moy. pl. bien faite beau rose frais et vif	1 75	» »	» »
127	PAUL JOSEPH.	1 25	» »	» »
59	PIERRE DE ST.-CYR.	» »	1 »	» »
58	REINE DES VIERGES.	» »	1 »	» »
32	SOUVENIR DE LA MALMAISON	» »	1 »	» »
124	* — A FLEUR ROSE gr. tr. pl. rose violacé. .	1 75	» »	» »
	NOISETTES.			
252	CÉLINE FORESTIER, moy. pl. plate jaune brill.	1 50	1 25	1 »
70	CLAUDIA AUGUSTIN.	» »	1 »	» »
353	ISABELLE GRAY.	» »	1 »	» »
351	LOUISE DARZINS.	1 25	» »	» 75
92	PHALOE	1 25	» »	» 75
	THÉS.			
76	AUGUSTE VACHER.	» »	1 »	» »
104	BOULE D'OR	» »	1 »	» »
109	BURET	» »	1 »	» »
110	CELST MULTIFLORE.	» »	1 »	» »
114	COMTE DE PARIS	» »	» »	» 75
101	* COMTESSE OUVAROFF, fl. gr. pl. bien faite beau rose clair teinté rose vif. . . .	1 75	» »	1 25
102	* GLOIRE DE BORDEAUX, tr. gr. pl., blanc d'argent, revers des pétales rose vif. .	1 75	» »	» »
113	* L'ENFANT TROUVÉ, gr. pl. glob. jaune soufre, centre plus foncé.	» »	1 50	» »
103	MADAME BLANCHET.	1 25	» »	» »
77	— MAURIN	1 25	1 »	» 75
79	PAULINE LABONTÉ	» »	1 »	» »
106	PRÉSIDENT	» »	1 »	» »
111	RUBENS	» »	1 »	» »
82	SAFRANO	» »	1 »	» »
105	* TRIOMPHE DE GUILLOT FILS, tr gr. tr. pl. blanc fortement nuancé de rose chair et ombré de saumoné	1 75	» »	1 25
112	— DE LUXEMBOURG.	» »	1 »	» »

DAHLIAS SURCHOIX.

Vingt-cinq des plus BELLES variétés.

La pièce, 50 centimes.
La douzaine, 5 francs.

DAHLIAS MINIATURE OU A BOUQUET.

Variétés à charmantes petites fleurs, propres à former des bouquets.

101 CHILD OF INNOCENCE, lilas nuancé de blanc.
104 CRIMSON BEAUTY, amaranthe cramoisi.
100 GOLDFINCH, orange fauve à pointes bronzées.
102 LITTLE JULIUS rouge carmin clair.

La pièce, 1 franc.

DAHLIAS NAINS

Ne s'élevant qu'à deux ou trois pieds de hauteur.

2 ALBA FLORIBUNDA NANA, blanc pur.
4 CHARLES ROUILLARD, cerise pourpré.
3 GOLDEN BALL, jaune d'or.
5 MISS ANNETTE, blanc rose, strié carmin.
1 PALAIS DE CRISTAL, écarlate.

La pièce, 75 centimes.

FRAISIERS NOUVEAUX (*Voir page* 10).



PLANTES OMISES.

SERRE CHAUDE.

APHELANDRA LIBONIANA (*Linden*).

Nouvelle et remarquable espèce, feuilles grandes, panachées de blanc le long de la nervure médiane. Les fleurs forment un épis de près d'un pied de hauteur et dépassent à peine les bractées florales dont le rouge éclatant produit un très-bel effet. . . . . 8 »

BEGONIA RADIATA (*Linden*), tout nouveau, feuilles d'un vert très-tendre sur lequel rayonnent de nombreuses bandes étroites et argentées. . . . . 5 »

CALADIUM AURITUM, espèce très-curieuse ayant en dessous de la feuille un appendice en forme d'oreille. . . . . 10 »

DICHORISANDRA ARGENTEO MARGINATA, feuilles roides et dures, de 5-6 pouces de longueur seulement, lanceolées aiguës d'un vert tendre, tandis qu'une bande argentée longe ses bords . . . . 12 »

ECHITES ARGYRÆA.

Qu'on se figure l'Echites nutans avec des feuilles plus grandes, d'un vert plus vif et satiné et le réseau rose, remplacé par des lignes d'un blanc argenté . . . . 8 »

PLEINE TERRE.

DIANTHUS SEMPERFLORENS EMILE PARÉ.

Variété de *l'OEillet Flon*, à fond rose tendre strié et lamé rose foncé; *très-distingué*. . . . . 5 »

DIANTHUS SEMPERFLORENS MARIE PARÉ.

C'est *l'OEillet Flon* à fleurs blanc pur. 1 50

LA BELGIQUE HORTICOLE,

JOURNAL DES JARDINS, DES SERRES ET DES VERGERS


RÉDIGÉ PAR

ED. MORREN,

PROFESSEUR DE BOTANIQUE A L'UNIVERSITÉ DE LIÉGE, SECRÉTAIRE
DE LA FÉDÉRATION DE L'HORTICULTURE BELGE.

TABLE.

—



COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)
European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer